



Vlaanderen
is kwaliteitsvolle
omgeving

Emissie en depositie van stikstof in Vlaanderen tijdens de periode 2015-2023

■ Een ruimtelijk-temporele analyse

Emissie en depositie van stikstof in Vlaanderen tijdens de periode 2015-2023

Een ruimtelijk-temporele analyse.

Dit rapport bevat de mening van externe auteur(s) en niet noodzakelijk die van de Vlaamse overheid.

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever

Toon Denys
Secretaris-generaal Departement Omgeving
Koning Albert-II laan 15 bus 553, 1210 Brussel (postadres)
vlaanderen.be/omgeving

Een uitgave van het Departement Omgeving, Afdeling Beleid
beleid.omgeving@vlaanderen.be

Auteurs

Hans Hooyberghs – VITO
Wouter Lefebvre – VITO
Felix Deutsch – VITO

Publicatiedatum

Maart 2026

Depotnummer

D/2025/3241/385

VITO Rapportnummer

2025/EI/R/3464

Foto cover

Steven De Saegher

Partners



INHOUDSTAFEL

1	Inleiding	3
2	Gebruikte datasets en modellen	4
2.1	Emissies	4
2.1.1	Historische emissies	4
2.1.2	Toetspunt 2030	6
2.2	Deposities	9
2.2.1	Historische deposities	9
2.2.2	Toetspunt deposities	9
3	Trends in emissies van stikstof	10
3.1	Methodologie van de trendanalyse	10
3.2	Trends van de Vlaamse emissietotalen	11
3.2.1	Totale stikstofemissies	11
3.2.2	Indeling in ammoniak- en stikstofoxide-emissies	12
3.3	Trends van de emissies per sector	14
3.3.1	GNFR-sectoren	14
3.3.2	Details voor landbouwsectoren	28
4	Analyse van de depositietrends	40
4.1	Methodologie van de trendanalyse	40
4.1.1	Temporele analyse	40
4.1.2	Ruimtelijk temporele analyse	41
4.2	Temporele analyse	41
4.2.1	Depositieopbouw	41
4.2.2	Trends van de totale depositie	43
4.2.3	Trends van de Vlaamse totale depositie	47
4.2.4	Trends van de depositie per sector	50
4.3	Ruimtelijk-temporele analyse	63
4.3.1	Trends van de totale depositie	63
4.3.2	Trends van de Vlaamse depositie	69
4.3.3	Trends van de Vlaamse NO _y - en NH _x -deposities	71
4.4	Bijkomende analyses	75
4.4.1	Depositie-uitwisseling met (Zuid-)Nederland	75
4.4.2	Effect van meteorologie	79
5	Conclusie.....	82
Bijlage A: Toetspunt 2030		83
1.1	Motivering voor herschaling van het toetspunt 2030	84
1.2	Toetspunt emissies 2030	84
1.2.1	Vlaamse emissies	84
1.2.2	Buitenlandse emissies	91
1.3	Toetspunt deposities 2030	91
Bijlage B: Gebruikte formules voor de trendanalyse		92
B.1	Temporele analyse van emissies en deposities	92
B.2	Spatio-temporele analyse van de depositie	93
Bijlage C: Trends van de concentraties		94

1 INLEIDING

Het stikstofdecreet van januari 2024 moet helpen om de natuur in een gunstige staat van instandhouding te brengen, door de stikstofdepositie¹ op de stikstofgevoelige Europees beschermde habitats te doen dalen. Het decreet bevat maatregelen en kaders voor de impactbeoordeling van stikstofemissies bij vergunningverlening om te voorkomen dat er in de SBZ-H een betekenisvolle aantasting plaatsgrijpt van de natuurlijke kenmerken van deze gebieden.

Voorliggend rapport “Emissie en depositie van stikstof in Vlaanderen tijdens de periode 2015-2023” geeft een diepgaande analyse van de ruimtelijk-temporele trends van stikstofemissies en -deposities in Vlaanderen. Het rapport biedt kwantitatieve analyses en inzichten over de evolutie van de emissies en stikstofdepositie in Vlaanderen tijdens de voorbije jaren en gaat na in hoeverre dit in overeenstemming is met de doelstellingen van het stikstofdecreet.

Voor de periode 2015–2023 worden de jaarlijkse emissies van stikstofdioxide (NO_x) en ammoniak (NH₃) voor alle relevante sectoren in kaart gebracht. Een trendanalyse onthult hoe de emissies in de recente jaren zijn geëvolueerd en of de huidige trends overeenkomen met het traject dat nodig is om de doelstellingen voor 2030 volgens het stikstofdecreet te behalen. Daarnaast wordt de jaarlijkse stikstofdepositie gemodelleerd op een resolutie van 1 km bij 1 km. Bij deze modellering worden andere parameters zoals meteorologische gegevens en kalibratiefactoren constant gehouden zodat kan worden ingeschat of en waar er sprake is van een netto depositiedaling enkel veroorzaakt door een verandering in de emissies. Daarnaast wordt een gevoeligheidsstudie uitgevoerd die het effect van de gebruikte meteorologische gegevens kwantificeert, door te werken met een jaarspecifieke meteorologie.

In het tweede hoofdstuk van dit rapport bespreken we de datasets en modellen welke gebruikt werden als invoer voor de (ruimtelijk-)temporele analyse. De twee daaropvolgende hoofdstukken geven de resultaten van de trendanalyse weer. In het derde hoofdstuk bespreken we de trends voor emissies, in het vierde hoofdstuk deze voor deposities. Een laatste hoofdstuk vat kort de belangrijkste conclusies samen.

Een bespreking van de concentratietrends vormt geen centraal onderdeel van dit rapport. Toch kunnen deposities niet los worden gezien van concentraties, en door naar de concentraties te kijken, kunnen we aanvullende interessante inzichten verkrijgen. Vandaar dat we in bijlage C ook de evolutie van de concentraties van ammoniak en stikstofdioxide bespreken.

¹ Doorheen dit rapport wordt, tenzij waar uitdrukkelijk anders vermeld, met stikstof enkel reactief stikstof bedoeld. Zie ook: <https://www.vmm.be/lucht/stikstof>

2 GEBRUIKTE DATASETS EN MODELLEN

2.1 EMISSIES

2.1.1 Historische emissies

Voor elk jaar in de beschouwde periode (2015 - 2023) wordt een gedetailleerd emissiebestand opgesteld per sector. We beschrijven in eerste instantie de Vlaamse emissies, welke zowel gebruikt worden in de analyse van de emissie- als depositietrends, en bekijken daarna de buitenlandse emissies, welke enkel relevant zijn voor de depositietrends.

2.1.1.1 Vlaamse emissies

De Vlaamse totale historische emissies gebruikt in de analyses in dit rapport zijn afkomstig van de historische tijdsreeks uit de emissie-inventaris lucht van VMM, zoals opgesteld in 2025. De indeling in sectoren gebeurt op basis van de GNFR-indeling (Geaggregeerde NFR (Nomenclature for Reporting)), welke op Europese schaal gebruikt wordt om emissies te rapporteren. Deze indeling maakt gebruik van volgende sectoren²:

- A: Energie, bevat emissies van energiecentrales
- B: Industrie, bevat emissies van industrie
- C: Andere Stationaire Energiebronnen, bevat voornamelijk emissies ten gevolge van gebouwenverwarming, maar ook een aantal andere stationaire verbrandingsbronnen, zoals deze gerelateerd aan landbouwserrres
- D: Vluchtige stoffen, bevat emissies van vluchtige stoffen
- E: Solventen, bevat emissies van solventen
- F: Wegtransport, bevat emissies van wegtransport
- G: Scheepvaart, bevat scheepvaartemissies van binnenvaart, scheepvaart tussen Noordzeehavens, scheepvaartbewegingen in de havens en bewegingen naar de Vlaamse havens toe.
- H: Luchtvaart, bevat luchtvaartemissies van de LTO-cyclus
- I: Offroad, bevat offroad emissies, inclusief offroad van landbouw
- J: Afvalverwerking, bevat emissies van afvalbehandeling
- K: Stalemissies, bevat emissies afkomstig van stallen en van de opslag van stalmest
- L: Andere landbouw, bevat emissies afkomstig van gebruik van kunstmest, mestverwerking, compostering, beweiding en het uitrijden van dierlijke mest.

Voor de analyse van de emissietrends in hoofdstuk 3 wordt enkel gebruik gemaakt van de emissietotalen uit de inventaris van VMM. Voor de berekening van de deposities, dient echter ook de verspreiding van de emissies over Vlaanderen op een ruimtelijke resolutie van 1 km op 1 km gekend

² Bemerk dat in vergelijking met de vorige versie van dit rapport ("Emissie en depositie van stikstof in Vlaanderen tijdens de periode 2015-2022"), [https://www.friscris.be/nl/publications/emissie-en-depositie-van-stikstof-in-vlaanderen-tijdens-de-periode-20152022\(971cb96a-bb74-40f9-9ba1-42c71d6133a4\).html](https://www.friscris.be/nl/publications/emissie-en-depositie-van-stikstof-in-vlaanderen-tijdens-de-periode-20152022(971cb96a-bb74-40f9-9ba1-42c71d6133a4).html)) een aantal emissies voor stationaire NOx-bronnen van sector verhuizen. Hierdoor is de bijdrage van sector D nu relatief groter, en deze van sector B en E relatief kleiner.

te zijn. Deze emissiespreidingspatronen worden aangemaakt met behulp van E-MAP³, het emissiespreidingsmodel van VITO, om de Vlaamse emissietotalen per sector te spreiden naar de locaties van de emissies. De methode waarop de emissies gespreid worden is afhankelijk van de details die reeds beschikbaar waren bij de invoerdata:

- Voor sectoren waarvoor initieel reeds puntbronnen werden aangeleverd (bv. stallen en grote industriële bedrijven) worden de locaties van de puntbronnen overgenomen.
- Voor sectoren waarvoor initieel al een patroon bekend is dat niet uit puntbronnen bestaat, wordt hierbij het patroon uit deze sector omgezet naar een 1 km bij 1 km raster (bv. voor wegverkeer en scheepvaart, waarvoor de data als lijnbronnen wordt aangeleverd).
- Voor sectoren waarvoor nog geen patroon bekend is (bv. voor offroad), maakt E-MAP gebruik van een inschatting op basis van proxy-data om emissies op een raster met 1 km op 1 km resolutie aan te maken.

Een overzicht van de herkomst van de emissietotalen en spreidingspatronen per sector wordt gegeven in Tabel 1. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de emissies verwijzen we naar VMM⁴.

We wensen tenslotte nog volgende opmerkingen te maken bij de gebruikte emissies:

- Voor de sector wegverkeer bestaan er twee opties om de totale verkeersemissies te berekenen. Enerzijds kan men vertrekken van de totale brandstofverkoop ('fuel sold' methode), anderzijds van het brandstofverbruik, berekend op basis van de gemodelleerde voertuigkilometers ('fuel used' methode). Deze methoden resulteren in verschillende inschattingen, voornamelijk vanwege factoren zoals tanktoerisme en de verkoop van brandstof aan voertuigen die niet of slechts gedeeltelijk op de weg rijden, zoals tractoren en werkvoertuigen op bouwplaatsen. Tot en met 2022 hanteerde VMM de 'fuel used' methode in zijn emissierapportage, maar vanaf 2023 werd overgestapt op de 'fuel sold' methode, conform Europese regelgeving voor dergelijke rapportages. Desondanks adviseren Europese emissie-experts het gebruik van 'fuel used' emissies voor modellering van luchtkwaliteit en depositie⁵. Daarom blijft in zowel de luchtkwaliteitsmodellering (waaronder de concentratiekaarten van VMM) als in de depositiemodellering de 'fuel used' data gehanteerd. Ook in de analyses van emissies en deposities in dit rapport wordt dus uitsluitend gebruik gemaakt van de 'fuel used' emissies voor wegverkeer.
- De impact van de Covid19-maatregelen op de emissies wordt meegenomen op basis van lagere activiteitsdata die gebruikt wordt in de emissiemodellen. Dit heeft vooral een invloed op de wegverkeersemissies en de luchtvaartemissies, welke lager uitvallen in 2020 en 2021 aangezien ook de voertuigkilometers en het aantal vluchten lager is. Voor deze sectoren kunnen de trends dus een afwijkend gedrag vertonen. Waar relevant wordt dit verder expliciet aangehaald.
- Voor luchtvaart wordt enkel gerekend met de emissies van de LTO-cyclus, zijnde de emissies onder 3000 voet.

³ Voor meer details zie het VITO rapport "E-MAP v3.1 documentatie", onderliggend aan een VITO-studie in opdracht van VMM (rapportnummer 2024/EI/R/3222).

⁴ Zie <https://www.vmm.be/lucht/evolutie-luchtkwaliteit/hoe-wordt-de-uitstoot-berekend>

⁵ Uit persoonlijke communicatie met Emisia.

Het is echter om diverse redenen aangewezen om de prognose 2030 uit het Plan-MER PAS niet over te nemen. De voornaamste redenen hiervoor zijn het gebruik van een afwijkende sectorindeling in het Plan-MER PAS, aanpassingen aan de emissiemodellen onderliggend aan de berekening van de emissietotalen voor landbouw en scheepvaart en aanpassingen aan de spreidingspatronen voor 2030 die gebruikt worden in E-MAP. Vandaar dat we voor deze studie een nieuw toetspunt definiëren, dat qua emissietotalen aansluit bij de totalen van het G8-scenario uit het Plan-MER PAS, en tegelijkertijd gebruik maakt van de meest recente sectorindeling en meest recente inschattingen voor de spreidingspatronen van de emissies. We gaan op deze plaats niet verder in op de bepaling van dit nieuwe toetspunt, maar een gedetailleerde beschrijving van de aannames die werden gemaakt om dit toetspunt te bekomen is opgenomen in bijlage A. We willen hier wel nog benadrukken dat dit toetspunt enkel dient om de huidige trends mee te vergelijken. Het toetspunt is geenszins een inschatting van wat de emissies in 2030 exact zullen zijn, en het is ook geen voorafname van toekomstige beleidsbeslissingen.

Tabel 1: Onderliggende databronnen voor de emissies voor alle sectoren. De eerste twee kolommen beschrijven de sector, de derde en vierde kolom geven respectievelijk de onderliggende modellen / datasets gebruikt bij de berekening van de emissietotalen en het spreidingspatroon van de emissies. Voor meer details verwijzen we naar <https://www.vmm.be/lucht/evolutie-luchtkwaliteit/hoe-wordt-de-uitstoot-berekend>. De laatste kolom geeft weer hoe de emissies zijn opgenomen in de VLOPS doorrekening⁶.

Sector	Label	Model gebruikt voor berekening emissietotaal	Herkomst spreidingspatroon in EMAP	Hoe opgenomen in VLOPS?
Energie	A	<ul style="list-style-type: none">Grote bedrijven: data van integrale milieujaarverslagen (IMJV)Andere emissies: op basis van Energiebalans Vlaanderen (VEKA)	<ul style="list-style-type: none">Grote bedrijven: overgenomen van IMJVAndere emissies: E-MAP	<ul style="list-style-type: none">Emissies met gekende locaties: puntbronnenAndere emissies: oppervlaktebron
Industrie	B	<ul style="list-style-type: none">Grote bedrijven: data van integrale milieujaarverslagen (IMJV)Andere emissies: op basis van Energiebalans Vlaanderen (VEKA)	<ul style="list-style-type: none">Grote bedrijven: overgenomen van IMJVAndere emissies: E-MAP	<ul style="list-style-type: none">Emissies met gekende locaties: puntbronnenAndere emissies: oppervlaktebron
Andere Stationaire Energiebronnen	C	EISSA-B	E-MAP	Oppervlaktebronnen
Vluchtige stoffen	D	<ul style="list-style-type: none">Grote bedrijven: data van integrale milieujaarverslagen (IMJV)Andere emissies: op basis van Energiebalans Vlaanderen (VEKA)	<ul style="list-style-type: none">Grote bedrijven: overgenomen van IMJVAndere emissies: E-MAP	<ul style="list-style-type: none">Emissies met gekende locaties: puntbronnenAndere emissies: oppervlaktebron
Solventen	E	<ul style="list-style-type: none">Grote bedrijven: data van integrale milieujaarverslagen (IMJV)Andere emissies: op basis van Energiebalans Vlaanderen (VEKA)	<ul style="list-style-type: none">Grote bedrijven: overgenomen van IMJVAndere emissies: E-MAP	<ul style="list-style-type: none">Emissies met gekend locaties: puntbronnenAndere emissies: oppervlaktebron
Wegverkeer	F	FASTRACE	Overgenomen uit FASTRACE	Oppervlaktebronnen
Scheepvaart	G	EMMOSS	Overgenomen uit EMMOSS	Oppervlaktebronnen
Luchtvaart	H	EMMOL	E-MAP	Oppervlaktebronnen
Offroad	I	OFFREM	E-MAP	Oppervlaktebronnen
Afvalverwerking	J	<ul style="list-style-type: none">Grote bedrijven: data van integrale milieujaarverslagen (IMJV)Andere emissies: op basis van Energiebalans Vlaanderen (VEKA)	<ul style="list-style-type: none">Grote bedrijven: overgenomen van IMJVAndere emissies: E-MAP	<ul style="list-style-type: none">Emissies met gekende locaties: puntbronnenAndere emissies: oppervlaktebron
Stallen	K	EMAV (versie 3.0)	Overgenomen uit EMAV	Puntbronnen
Andere landbouw	L	EMAV (versie 3.0)	Overgenomen uit EMAV	<ul style="list-style-type: none">Mestverwerkers: puntbronnenAndere emissies: oppervlaktebron

⁶ Bemerk dat in vergelijking met de vorige versie van dit rapport ("Emissie en depositie van stikstof in Vlaanderen tijdens de periode 2015-2022)", [https://www.friscris.be/nl/publications/emissie-en-depositie-van-stikstof-in-vlaanderen-tijdens-de-periode-20152022\(971cb96a-bb74-40f9-9ba1-42c71d6133a4\).html](https://www.friscris.be/nl/publications/emissie-en-depositie-van-stikstof-in-vlaanderen-tijdens-de-periode-20152022(971cb96a-bb74-40f9-9ba1-42c71d6133a4).html)) een aantal emissies voor stationaire NOx-bronnen van sector verhuizen. Hierdoor is de bijdrage van sector D nu relatief groter, en deze van sector B en E relatief kleiner.



2.2 DEPOSITIES

2.2.1 Historische deposities

De stikstofdepositie (te wijten aan NH_x en NO_y) wordt met een resolutie van 1 km op 1 km berekend met het VLOPS-model⁷. Voor de analyses in dit rapport werd gebruik gemaakt van VLOPS25, gebaseerd op OPS modelversie L-5.3.1.0. De emissies worden opgenomen als puntbronnen of oppervlaktebronnen met een 1 km op 1 km resolutie, al naargelang de detailinformatie die beschikbaar is (zie Tabel 1 voor details). Het rekenrooster omvat Vlaanderen en Zuid-Nederland (provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland)⁸.

De VLOPS-resultaten worden gekalibreerd op basis van kalibratiefactoren bepaald door de VMM op basis van de verhoudingen tussen de metingen en het model. Bij de analyse van de sectoren is er voor gekozen om de kalibratiefactoren in te werken in de sector- en pollutentbijdragen. Dit wil zeggen dat sector- en pollutentbijdragen in dit rapport niet de resultaten van de ruwe VLOPS-berekeningen zijn maar reeds de kalibratiefactoren in zich hebben.

Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de DON⁹. Op deze manier zijn de resultaten in dit document in overeenstemming met de huidige data opgenomen in de impactscore- en depositietrendtool (vanaf 4 juli 2025).

De trendanalyse gebeurt op basis van het meteorjaar 2017, wat in overeenstemming is met de keuze in de impactscore- en depositietrendtool. Alle emissiejaren (periode 2015 – 2023 en toekomstjaar 2030) worden dus doorgerekend met dezelfde meteorologische data, zodat de trendanalyse enkel het effect van de emissieveranderingen in beeld brengt. We nemen hierbij ook aan dat voor alle doorrekeningen de kalibratiefactoren van 2017 gebruikt moeten worden. Sectie 4.4.2 vormt hierop de uitzondering, aangezien daarin de impact van de meteorologische gegevens onderzocht wordt. Meer details hierover worden beschreven in deze sectie.

2.2.2 Toetspunt deposities

Het toetspunt deposities voor 2030 wordt bepaald door een doorrekening met VLOPS25 op basis van meteorologische gegevens voor 2017, en ook de kalibratie vindt plaats op basis van de kalibratiefactoren voor 2017. De emissie-invoer bestaat uit het toetspunt 2030 beschreven in paragraaf 2.1.

⁷ Deze berekeningen worden uitgevoerd door VMM.

⁸ In vergelijking met de vorige versie van dit rapport ("Emissie en depositie van stikstof in Vlaanderen tijdens de periode 2015-2022"), [https://www.friscris.be/nl/publications/emissie-en-depositie-van-stikstof-in-vlaanderen-tijdens-de-periode-20152022\(971cb96a-bb74-40f9-9ba1-42c71d6133a4\).html](https://www.friscris.be/nl/publications/emissie-en-depositie-van-stikstof-in-vlaanderen-tijdens-de-periode-20152022(971cb96a-bb74-40f9-9ba1-42c71d6133a4).html)) werden er aanpassingen gedaan aan de parameters voor de scheepvaartemissies. Deze worden nu op dezelfde manier behandeld als in de ATMO-Street doorrekeningen voor de officiële concentratie jaar kaarten.

⁹ Toelichting waarom vermestende depositie geen rekening houdt met Dissolved Organic Nitrogen (DON): https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1752822246/repositories-prd/2025717_VMM-nota_bijtellings_depositie_tirdqt.pdf

3 TRENDS IN EMISSIONS VAN STIKSTOF

3.1 METHODOLOGIE VAN DE TRENDANALYSE

Het eerste onderdeel van dit rapport is een analyse van de emissietrends. In deze analyse maken we voor alle onderzochte sectoren en activiteiten gebruik van de totale emissie van die sector/activiteit in Vlaanderen. De trends worden zowel aan de hand van een lineair als een exponentieel regressiemodel bepaald. Voor de lineaire regressie gaan we uit van een relatie $Emissie = a * Jaar + b$, met b het intercept en a de helling (richtingscoëfficiënt) van de trendlijn. Hierbij is vooral de helling een belangrijke parameter, want het is een maat voor de trend van de evolutie: de gemiddelde afname of toename van de emissies per jaar (bijvoorbeeld, een helling van -100 ton N/jaar betekent dat de jaarlijkse emissie van stikstof over de onderzochte periode jaarlijks gemiddeld met 100 ton afgenomen is). Een lineaire regressie geeft een goede inschatting van de verandering van de emissie gedurende de voorbije jaren, maar is, in sommige gevallen, minder geschikt om projecties voor de toekomst te maken. Ze neemt immers aan dat de emissies in dezelfde mate blijven dalen, terwijl in een realistisch scenario de dalingen vermoedelijk afvlakken voor sectoren met een snelle daling, aangezien de eerste emissiedalingen makkelijkere maatregelen behelzen dan de laatste. Daarom voeren we ook telkens een exponentiële regressie uit, $Emissies = b * e^{a*Jaar}$. De belangrijkste parameter in deze regressie is de factor a , die de jaarlijkse relatieve daling van de emissies weergeeft (bijvoorbeeld, een waarde 0,95 komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse afname van de emissies met 5%)¹⁰. Voor zowel de lineaire als de exponentiële regressies bepalen we ook de standaarddeviatie en het 95% betrouwbaarheidsinterval van de parameter die de trend beschrijft. Bij deze bepaling van het betrouwbaarheidsinterval houden we enkel rekening met de statistische onzekerheid op de trendlijn, en niet met de onzekerheid gelinkt aan de onderliggende emissiemodellen en de invoerdata gebruikt in deze modellen (emissiefactoren, activiteitendata zoals verkeers- en scheepvaartvolumes). Op basis van het betrouwbaarheidsinterval, kunnen we besluiten of er een significante daling of stijging plaatsvindt, of dat het teken van de trend niet significant is. Met een significante daling bedoelen we in deze analyse dat het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de helling van de lineaire trendlijn volledig onder nul ligt en dat ook het betrouwbaarheidsinterval voor de exponentiële regressie onder één ligt. Een significante stijging wordt analoog gedefinieerd, en de trend is niet significant als er geen significante daling of stijging is. Bemerkt ook dat het verschil tussen de lineaire en de exponentiële extrapolatie al een indicatie geeft van de onzekerheid veroorzaakt door de aannames rond de extrapolatie. De gedetailleerde werkwijze wordt besproken in bijlage B.

We gebruiken verder de lineaire en exponentiële trendlijn om een projectie te maken van het emissieverloop naar 2030. Hiertoe worden, bij gelijkblijvende trend, emissiewaarden berekend voor het jaar 2030. Deze waarden geven weer op welke emissies we zouden uitkomen als de huidige absolute (lineaire regressie) of relatieve (exponentiële regressie) trend ongewijzigd blijft tot 2030. In deze analyse doen we echter geen uitspraak over het realistisch zijn van deze trend, en we doen ook geen uitspraak over welke trend het meest realistisch is (exponentieel of lineair). Deze waarden worden vergeleken met de inschattingen zoals opgenomen in het toetspunt 2030 dat beschreven wordt in paragraaf 2.1.2. Ook voor de projectie naar 2030 bij aangehouden trend wordt een onzekerheid berekend, volgens de formules voor de standaardfout uit bijlage B. Bij de bepaling van het betrouwbaarheidsinterval wordt enkel rekening gehouden met de statistische onzekerheid op de

¹⁰ In de figuren in dit rapport zullen we steeds de parameter a rapporteren, terwijl we in de tekst vaak refereren aan de 5% daling of stijging die gepaard gaat met de parameter a .


trendlijn, en niet met de onzekerheid op de extrapolatie ervan, noch met de onzekerheid gelinkt aan de emissiemodellen en hun invoerdata.

Eerst bespreken we in de volgende sectie (3.2) de Vlaamse emissietotalen, de daaropvolgende sectie (3.3) geeft een analyse per (sub)sector volgens de GNFR-indeling. We zoomen daarbij gaandeweg in op een fijner detailniveau.

3.2 TRENDS VAN DE VLAAMSE EMISSIETOTALEN

3.2.1 Totale stikstofemissies

Figuur 1 toont het verloop van de totale (reactieve) Vlaamse stikstofemissies (uitgedrukt in ton N). Met de totale emissies bedoelen we de emissies van stikstof uit stikstofoxides (NO_x) en ammoniak (NH_3) opgeteld voor alle sectoren. De zwarte bollen geven de gerapporteerde emissies voor de jaren 2015 tot en met 2023, zoals beschreven in sectie 2.1.1.1. De groene en oranje lijn tonen de lineaire respectievelijk exponentiële trend van deze datapunten, geëxtrapoleerd tot het jaar 2030. Bij deze extrapolatie wordt alleen rekening gehouden met de statistische onzekerheid van de trendlijn, en niet met de aanzienlijke onzekerheid die voortkomt uit de extrapolatie zelf. Het is namelijk onzeker of de huidige trends zich op dezelfde manier zullen voortzetten tot 2030. Bij het interpreteren van de grafieken en het vergelijken van de projecties met de doelstelling voor 2030 moet deze onzekerheid in acht worden genomen.



Figuur 1: Verloop van de totale jaarlijkse Vlaamse stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.


We kunnen deze waarden en trends vergelijken met de emissies voor 2030 uit het toetspunt, welke rechtstreeks overgenomen is uit het stikstofdecreet. In het toetspunt bedragen de emissies in 2030 43,1 kton N. De prognose op basis van de geleverde inspanningen van de laatste jaren valt op basis van een lineaire extrapolatie van de historische emissies dus lager dan de doelstelling van het stikstofdecreet, en ook het 95% betrouwbaarheidsinterval van deze prognose ligt volledig lager dan deze doelstelling. Indien een exponentiële extrapolatie gebruikt wordt, omvat het 95% betrouwbaarheidsinterval de doelstelling uit het stikstofdecreet, en de schatting voor de prognose ligt rond deze doelstelling.

We kunnen de situatie ook bekijken voor de twee pollutanten ammoniak (NH_3) en stikstofoxides (NO_x) apart, zoals getoond in Figuur 2 en Figuur 3. Daarbij valt een duidelijk verschil in de evolutie voor NO_x en NH_3 op.

De emissie van ammoniak kent anderzijds ook een statistisch significante daling, maar deze daling is veel kleiner. De lineaire trend gaat uit van een daling van 520 [260; 770] ton N per jaar, de exponentiële trend van een daling van 1,5 [0,7 ; 2,3] percent per jaar. Indien de historische trends worden verdergezet, bereiken we 38 [27 ; 30] kton N in 2030 volgens een verderzetting van de lineaire trend, en 29 [27 ; 30] kton N in 2030 volgens een verderzetting van de exponentiële trend. In beide gevallen ligt de prognose voor 2030 dus ver boven de doelstelling uit het stikstofdecreet (21,3 kton N), welke ook is opgenomen in het toetspunt 2030. De huidige evolutie leidt dus tot een prognose


boven het toetspunt 2030 en voor ammoniak lijkt dus een trendbreuk nodig te zijn om de 2030-doelstelling uit het stikstofdecreet alsnog te behalen.

Samengevat tonen deze resultaten aan dat de dalende trend voor de totale stikstofemissies (sectie 3.2.1) het gevolg is van een beperkte daling van de NH_3 -emissies, welke overgecompenseerd wordt door een sterke daling van de NO_x -emissies.



Figuur 2: Verloop van de totale jaarlijkse Vlaamse NO_x -emissies (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.


Voor energie en industrie wordt bij voortzetting van beide trends een prognose bereikt waarbij het 95% betrouwbaarheidsinterval volledig lager ligt dan het toetspunt.




Figuur 4: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) voor de sector Energie (sector A) in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.

Voor de kleinere sectoren solventen en vluchtige stoffen variëren de emissies van jaar tot jaar. Hierdoor is ook de onzekerheid op de trends en de prognose naar 2030 vrij groot. Voor solventen ligt de ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de prognose voor 2030 op basis van de lineaire trend zelfs onder nul, wat natuurlijk geen realistische situatie is. Niettegenstaande deze onzekerheid vinden we een significant dalende trend voor deze sector. Ook voor de sector vluchtige stoffen is er een relatief grote variatie van jaar tot jaar, maar wordt er finaal toch een significante dalende trend vastgesteld.

Samengevat besluiten we dat de emissies van de industriële sectoren trends volgen die leiden tot prognoses in de buurt van het toetspunt 2030.



Figuur 6: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) voor de sector Vluchtige stoffen (sector D) in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Omdat emissies voor stationaire NO_x -bronnen van sector B naar sector D en E verhuizen, is de verandering van emissies binnen de sectoren vluchtige stoffen en solventen relatief groot ten opzichte van vorige rapportering. De historische reeks is opnieuw berekend maar een aanpassing van toetspunt 2030 is momenteel niet mogelijk. Om deze reden wordt er geen toetspunt getoond.




3.3.1.2 Transportsectoren

Vervolgens focussen we op de emissies van de transportsectoren: wegverkeer (GNFR sector F, Figuur 8), scheepvaart (GNFR sector G, Figuur 9), luchtvaart (GNFR sector H, Figuur 10) en offroad verkeer (GNFR sector I, Figuur 11). De emissies van al deze sectoren vertonen significante, sterke dalingen, al zijn er bij een aantal sectoren wel een paar kanttekeningen te plaatsen.


De wegverkeersemissies dalen zeer sterk met 1300 [900 ; 1800] ton N per jaar (lineaire trend) of met 12 [8 ; 16] percent per jaar (exponentiële trend). Deze sterk dalende trend in de laatste jaren wordt veroorzaakt door sterke dalingen in de emissies per gereden kilometers van de personenwagens, door een shift naar benzine en doordat de reële emissies van dieselloertuigen voordien ver boven de EU-norm lagen en de meest recente dieselloertuigen nu lagere emissies hebben (al voldoen ze nog niet aan de norm). Ook de invoering van elektrische wagens zorgt voor een verdere daling. Als gevolg van deze dalingen van de emissiefactoren, konden binnen enkele jaren belangrijke emissiereducties in het wegverkeer gerealiseerd worden. Het is echter onwaarschijnlijk dat zulke sterke dalingen ten gevolge van technische maatregelen zich kunnen blijven voortzetten in de toekomst, wat ook wordt aangetoond door de extrapolatie op basis van de lineaire trend. Indien de huidige lineaire trend zou aanhouden, komen we voor 2027 en latere jaren uit op negatieve emissies, wat natuurlijk geen realistische situatie is. De exponentiële trend leidt (logischerwijze) wel tot een inschatting van positieve emissies, maar ook deze komt met een grote onzekerheid. Deze onzekerheid wordt nog vergroot door de impact van de Corona-pandemie, welke een sterke impact heeft op de verkeersemissies van 2020 en 2021. Als gevolg hiervan liggen de inschattingen voor deze jaren onder de trend, zowel voor de lineaire als de exponentiële trend. Aangezien het laatste jaar uit de analyse (2023) kort na de Corona-pandemie plaatsvond, is het met de huidige cijfers ook niet in te schatten in hoeverre de lange termijn voertuigkilometers (en emissies) beïnvloed worden door bijhorende paradigmashifts zoals de invoering van thuiswerk. Indien we, ondanks al deze onzekerheden, toch uitgaan van een extrapolatie naar de toekomst op basis van de historische exponentiële trend¹¹, vinden we dat de prognose voor 2030 in lijn ligt met het toetspunt.

¹¹ Het is evident dat het gebruik van de lineaire trend zinloos is voor deze sector omdat we voor 2027 en latere jaren op negatieve emissies uitkomen.

Ook de scheepvaartemissies vertonen een significante, sterk dalende trend, al is de daling wel kleiner dan die voor wegverkeer. We observeren een daling van 290 [190 ; 400] ton N per jaar (lineaire trend) of 4,8 [2,9 ; 6,7] percent per jaar. Voor deze sector liggen de emissies van de voorbije jaren reeds duidelijk lager dan de emissies van het toetspunt, en als de dalende trend aangehouden blijft, ligt dus ook de prognose voor 2030 lager dan het toetspunt.




Figuur 9: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) voor de sector Scheepvaart (sector G) in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.



Figuur 10: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) voor de sector Luchtvaart (sector H) in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijk exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.

De emissies van de sector offroad vertonen een significante, sterk dalende trend van 110 [90; 130] ton N per jaar (lineaire trend) of 8,4 [7,9 ; 8,9] per cent per jaar (exponentiële trend). Ook hier valt op te merken dat de huidige lineaire trend niet kan aangehouden worden tot 2030, aangezien de prognose voor 2030 op basis van een aangehouden lineaire trend amper 50 [-100 ; 200] ton N bedraagt. Ook een aangehouden exponentiële trend leidt echter tot een prognose die lager is dan de emissies uit het toetspunt.

Samengevat besluiten we dat de emissies van de transportsectoren, ondanks alle onzekerheid, trends volgen die leiden tot prognoses lager dan of in de buurt van het toetspunt voor 2030.




Figuur 11: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) voor de sector Offroad (sector I) in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Parse kruis: toetspunt voor 2030.

3.3.1.3 Landbouwsectoren

In deze sectie bespreken we de emissies van de landbouwsectoren. We bekijken zowel de emissies van de twee GNFR-sectoren stallen (sector K, Figuur 12) en andere landbouw (sector L, Figuur 13), als de som van beide sectoren (Figuur 14). Bemerkt dat de combinatie van sector K en L eigenlijk niet 100% overeenkomt met het totaal van alle landbouwemissies, aangezien er een beperkt deel van de landbouwemissies is opgenomen in de andere sectoren (o.a. off-road in sector I, en stationaire bronnen door verwarming in sector C). Dit gaat echter om een beperkt emissietotaal¹², en deze bijdrage heeft geen invloed op de trendanalyse uit deze studie.


De stalemissies volgen een significante, beperkt dalende trend. De emissies volgen een lineair dalende trend van 400 [220; 590] ton N per jaar, of een exponentieel dalende trend van 1,9 [1,0 ; 2,9] percent per jaar. Indien de huidige trends worden doorgezet tot in 2030, bereiken we prognoses die ongeveer 40% hoger zijn dan de emissies opgenomen in het toetspunt 2030.



Figuur 12: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) voor de sector Stallen (sector K) in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijk exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.

¹² In het 2015-basisjaar uit het Plan-MER PAS is de stikstofemissie van de sectoren off-road landbouw en off-road bosbouw samen gelijk aan 1 à 2 % van de stikstofemissies van de sector landbouw. Het gedeelte van de landbouwemissies dat nu in sector C opgenomen is kan moeilijker op deze manier numeriek ingeschat worden maar is tevens heel beperkt.

Voor de andere landbouwemissies is er geen significante trend waar te nemen. De emissies dalen wel maar de trend is niet significant verschillend van 0. Concreet geeft het betrouwbaarheidsinterval een verandering van -140 [-300 ; 30] ton N/jaar (lineaire trend) of -1,0 [-2,1; 0,02] percent per jaar (exponentiële trend). Zowel een volgehouden lineaire als een volgehouden exponentiële trend leiden in 2030 tot een prognose die ongeveer 30% boven de emissies van het toetspunt ligt.



Figuur 13: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) voor de sector Andere landbouw (sector L) in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.

Vlaamse totale stikstofemissies (NO_x + NH₃)
Sector Totale landbouw (sector K+L)

The graph displays the following data series:

- Historische emissies:** Black dots representing historical emissions from 2015 to 2023.
- Exponentiële trend:** An orange line showing an exponential trend with a rate of 0.98 [0.98 ; 0.99] per year.
- Lineaire trend:** A teal line showing a linear trend with a decrease of -540 [-840 ; -240] ton N per year.
- Toetspunt 2030:** A purple 'x' mark indicating the target emission level of 22,000 ton N for the year 2030.

Jaar	Emissie (ton N)	Type
2015	37000	Historische emissies
2016	37000	Historische emissies
2017	36500	Historische emissies
2018	36000	Historische emissies
2019	35500	Historische emissies
2020	35500	Historische emissies
2021	35000	Historische emissies
2022	33500	Historische emissies
2023	32500	Historische emissies
2030	29500	Extrapolatie (Trend)
2030	22000	Toetspunt 2030


¹³ Het Stikstofdecreet is op 23 februari 2024 in werking getreden.

3.3.1.4 Overige sectoren

In deze sectie bekijken we de twee overige sectoren: andere stationaire energiebronnen (GNFR sector C, Figuur 15) en afvalverwerking (GNFR sector J, Figuur 16).

De sector met andere stationaire bronnen bevat voornamelijk de emissies van huishoudens en serres. Deze sector vertoont een significant dalende trend met een jaarlijkse lineaire daling van 84 [16; 150] ton N per jaar, of een exponentiële daling van 3,0 [0,5 ; 5,5] percent per jaar. Indien de huidige trends worden doorgezet tot in 2030, bereiken we prognoses waarvan het volledige betrouwbaarheidsinterval lager ligt dan de emissies opgenomen in het toetspunt.

Sector afvalverwerking is een kleine sector met een beperkte bijdrage tot de totale emissies. De emissies van deze sector verschillen sterk van jaar tot jaar. Als gevolg hiervan is er geen significante trend vast te stellen, en is er dus ook een grote onzekerheid op de prognose voor 2030.




Figuur 15: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) voor de sector Andere Stationaire Energiebronnen (sector C) in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.

De trend van de emissies van runderstallen verschilt sterk naarmate de onderliggende categorie. Voor melkvee en mestkalveren wordt een significant stijgende trend geobserveerd, terwijl voor vleesvee een significant, sterk dalende trend wordt geobserveerd. Voor melkvee observeren we een jaarlijkse toename van de emissies met 75 [56; 94] ton N per jaar (lineaire trend) of met 1,9 [1,3; 2,4] percent per jaar (exponentiële trend). Aangezien de emissies van alle historische jaren reeds boven de emissies uit het toetspunt liggen en er een stijgende trend is, ligt ook de prognose voor 2030 boven de emissies uit het toetspunt, welke voor deze sector gelijk zijn aan de doelstelling uit het stikstofdecreet. Als de huidige trend wordt verdergezet, bereiken we in 2030 emissies die ongeveer 75% hoger liggen dan de waarde opgenomen in het stikstofdecreet.


De stijgende trend voor mestkalveren is niet significant en kleiner dan deze voor melkvee. Voor deze diercategorie veranderen de emissies met 2,7 [-1,4 ; 6,8] ton N per jaar (lineaire trend) of met 0,5 [-0,3; 1,3] percent per jaar (exponentiële trend). Ook voor deze diercategorie zijn de historische emissies van alle jaren hoger dan de emissies opgenomen in het toetspunt en is er geen significant dalende trend, waardoor, bij verderzetting van de huidige trend, de emissies in 2030 hoger zullen liggen dan de emissies uit het toetspunt. Concreet leidt het huidige pad tot emissies die wat meer dan 50% hoger liggen dan deze uit het toetspunt.

De situatie is totaal verschillend voor vleesvee. Voor deze sector zien we een significant dalende trend van 87 [70; 110] ton N per jaar (lineaire trend) of 3,2 [2,5; 3,8] percent per jaar (exponentiële trend). Bij verderzetting van deze sterk dalende trend, wordt in 2030 een waarde bereikt die ruwweg 23-30% lager dan het toetspunt ligt, afhankelijk of voor de lineaire of voor de exponentiële trend gekozen wordt. Voor deze diercategorie wordt de doelstelling uit het stikstofdecreet dus gehaald als de huidige trends zich verderzetten.




Figuur 18: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) voor de sector Mestkalveren in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.


Voor de emissies van pluimveestallen is er geen significante trend vast te stellen. Er lijkt zich een kleine dalende trend voor te doen, maar aangezien de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval van de lineaire trend boven nul ligt, is deze trend niet significant. Aangezien het stikstofdecreet uitgaat van een sterke daling van de emissies tegen 2030, en er geen significante trend plaatsvindt, wordt ook de doelstelling van het stikstofdecreet niet bereikt als de huidige trend wordt aangehouden. Concreet ligt de prognose voor 2030 op basis van de huidige trend bijna dubbel zo hoog als de emissies van het toetspunt 2030.



Figuur 20: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) voor de sector Pluimvee in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030. Aangezien de onzekerheidsintervallen en trendlijn van de lineaire en de exponentiële regressie sterk op elkaar lijken, is enkel de data voor de lineaire trendlijn duidelijk zichtbaar.




De emissies van de stallen van andere dieren dragen slechts beperkt bij tot de totale emissies van de sector K (ook al zijn de emissies bijvoorbeeld wel groter dan die van andere sectoren, zoals sector E solventen). In deze categorie nemen we onder andere de emissies op van de stallen met paarden, schapen, geiten, nertsen en konijnen. Deze emissies vertonen een significante, stijgende trend van 11 [9; 12] ton N per jaar (lineaire trend) of 3,0 [2,6; 3,4] percent per jaar (exponentiële trend). Bij verderzetting van de huidige trend wordt het toetspunt voor 2030 overschreden. Bemerkt dat voor deze diercategorie dit toetspunt, in tegenstelling tot voor de andere diercategorieën, niet expliciet is opgenomen in het stikstofdecreet als emissietaakstelling.



Figuur 22: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) voor de sector Andere dieren in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Parse kruis: toetspunt voor 2030.


Voor de deelsector kunstmest wordt geen significante trend geobserveerd, van -72 [-181; 37] ton N per jaar (lineaire trend) of -2,7 [-6,7; 1,5] percent per jaar (exponentiële trend). Er is bij deze deelsector wel een sterke jaarlijkse variatie in de emissies, en dus is ook de onzekerheid op de trend groter. Ondanks deze onzekerheid ligt het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de prognose volledig onder de emissies uit het toetspunt 2030, zowel voor de lineaire als de exponentiële trend.



Figuur 24: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies ($\text{NO}_x + \text{NH}_3$) voor de sector Kunstmest in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.



De deelsector uitrijden, welke de emissies bevat gerelateerd aan het uitrijden van dierlijke mest, is de grootste deelsector van de andere landbouwemissies. Deze sector vertoont een niet-significante trend: toename van 53 [-67; 173] ton N per jaar (lineaire trend) of 0,6 [-0,8; 2,0] percent per jaar (exponentiële trend). Het jaar 2023 wijkt duidelijk af van de voorheen stijgende trend. Aangezien de emissies van deze deelsector voor de historische jaren reeds meer dan dubbel zo groot zijn als de emissies uit het toetspunt 2030 én er geen significant dalende trend plaatsvindt, ligt de prognose voor 2030 veel hoger dan de emissies uit het toetspunt 2030.



Figuur 26: Verloop van de jaarlijkse totale stikstofemissies (NO_x + NH₃) voor de sector Uitrijden van dierlijk mest in Vlaanderen (in ton N). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse emissies voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten voor de periode 2015-2023. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de emissies volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.

4 ANALYSE VAN DE DEPOSITIETRENDS

In het tweede deel van het rapport analyseren we de depositietrends. We bekijken hier zowel de trends van de depositie op Vlaamse schaal in de tijd (temporele analyse), als ook hoe deze temporele trends verschillen van locatie tot locatie (ruimtelijk-temporele analyse). De deposities die in dit rapport beschouwd worden, zijn steeds gekalibreerd, zoals beschreven in sectie 2.2.1.

Sectie 4.1 duidt de verschillen tussen beide analyses en bespreekt de methodologie die gebruikt wordt bij beide analyses. In de volgende sectie (4.2) bespreken we de resultaten van de temporele analyse, zowel voor de totale depositie als de depositie gerelateerd aan de emissies van de (deel)sectoren. Sectie 4.3 bespreekt de resultaten van de ruimtelijk-temporele analyse.

4.1 METHODOLOGIE VAN DE TRENDANALYSE

4.1.1 Temporele analyse

In de temporele analyse (sectie 4.2) beschrijven we hoe de deposities gemiddeld over Vlaamse habitats evolueren, en dit zowel voor de totale depositie als de depositie gerelateerd aan de Vlaamse emissies van de GNFR-sectoren die ook werden beschouwd in het vorige hoofdstuk 3. We kiezen ervoor om de deposities uit te middelen over de stikstofgevoelige habitats, aangezien het doel van het stikstofdecreet net is om de depositie op deze locaties te reduceren. Om de locaties van de gevoelige habitats te bepalen, maken we gebruik van de KDW-kaart opgenomen in de impactscoretool vanaf juli 2025, welke samengesteld is op basis van volgende bronnen:

- BWK-habitatkaart 2023¹⁴
- Natuurstreefbeelden juni 2025¹⁵
- Zoekzones v0.2¹⁶

Concreet nemen we enkel gebieden op die in één van deze kaarten beschouwd zijn, en in SBZ-H gelegen zijn, en waarbij de kritische depositiewaarde (KDW¹⁷) kleiner dan of gelijk is aan 34 kg N/ha/jaar. De gebieden worden vervolgens gewogen op basis van hun oppervlakte, zodat we de gemiddelde depositie op de Vlaamse habitats bekomen.

De methodologie om de trends van deze gemiddelde depositie te bepalen is zeer gelijkaardig aan deze voor de emissies in hoofdstuk 3. We bepalen opnieuw een lineaire en exponentiële trend op basis van de historische deposities, en gebruiken deze trends ook om een inschatting te maken van de deposities in 2030. Voor beide grootheden wordt opnieuw een betrouwbaarheidsinterval bepaald op basis van de formules in bijlage B. De projectie voor de deposities in 2030 wordt vergeleken met het toetspunt 2030, beschreven in sectie 2.2.2. Voor een meer gedetailleerde beschrijving betreffende de interpretatie van beide regressies verwijzen we naar de desbetreffende sectie over de emissietrends (sectie 3.1).

¹⁴ <https://www.vlaanderen.be/DataCatalogRecord/9fffedd9-5076-4310-a366-198947717725>

¹⁵ <https://www.vlaanderen.be/datavindplaats/catalogus/natuurstreefbeelden> versie juni 2025

¹⁶ <https://www.vlaanderen.be/DataCatalogRecord/c1c4d674-f94a-42b8-a70d-098ddb0e9ced>

¹⁷ Voor de KDWs wordt hier gebruik gemaakt van de bijgestelde KDWs uit Vanden Borre et al. 2024 (<https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/112167841/INBO.A.4770..pdf>).

4.1.2 Ruimtelijk temporele analyse

In de ruimtelijk-temporele analyse brengen we het ruimtelijke aspect van de depositietrends in beeld, we bekijken dus hoe de temporele trends verschillen van locatie tot locatie in Vlaanderen. Het stikstofdecreet beoogt immers niet enkel een daling van de gemiddelde depositie, maar ook een daling van de depositie op elk habitatgebied.

We bekijken in deze sectie de evolutie van de depositie op elke VLOPS-rooster cel. We focussen hierbij enkel op de lineaire trend en bepalen deze over de periode 2015 – 2023 op basis van de formules in bijlage B. Voor elke 1 km bij 1 km rooster cel bekomen we dus een trend, gegeven door de richtingscoëfficiënt van de lineaire trend in die rooster cel. De onzekerheid van (het teken van) de trend wordt vervolgens ingeschat door een teststatistiek te berekenen op basis van de standaarddeviatie van de trendlijn. Op basis van een test steunende op de studentverdeling wordt deze teststatistiek vervolgens omgezet in een p-waarde, welke duidt hoe zeker of onzeker de trend in een bepaalde rooster cel is. De methodologie wordt in detail uitgelegd in bijlage B.2. Het is finaal belangrijk te duiden dat deze p-waarde enkel een maat is voor de onzekerheid op de regressie, en geen rekening houdt met de onzekerheid van de onderliggende datasets.

4.2 TEMPORELE ANALYSE

4.2.1 Depositieopbouw

Vooraleer de analyse van de veranderingen van de deposities doorheen de tijd te starten, is het interessant om te kijken naar de depositiebijdrage per GNFR-sector voor de historische jaren en het toetspunt. Figuur 27 toont deze opbouw, uitgemiddeld over stikstofgevoelige habitats in SBZ-H. De figuur toont in detail de bijdrage van alle Vlaamse sectoren en het buitenland aan de NH_x - en NO_y -depositie voor alle beschouwde historische jaren en voor het toetspunt in 2030. De buitenlandse bijdrage is hier verder nog gesplitst in Nederland en ander buitenland. Om de trends naar 2030 in te schatten, wordt op de figuur ook de beoogde ontwikkeling getoond, indien een lineaire of exponentiële trend tussen de deposities van 2015 en die van het toetspunt in 2030 wordt gevolgd. Deze analyse geeft voor elk tussenliggend jaar de verwachte deposities weer, gebaseerd op de veronderstelling van een lineaire of exponentiële trend tussen 2015 en 2030.

Het is belangrijk om op te merken dat deze berekening op niveau van stikstofgevoelige habitats binnen SBZ-H verschilt van de brontoewijzing op niveau van gans Vlaanderen, zoals die bijvoorbeeld gepubliceerd werd door de VMM¹⁸. Daar zijn verschillende redenen voor waarvan de eerstgenoemde veruit de belangrijkste is:

- VMM berekent het gemiddelde over gans Vlaanderen. De berekening hier is enkel voor de stikstofgevoelige habitats binnen SBZ-H.
- VMM gebruikt de meteorologie voor hetzelfde jaar als de emissies. In de analyse in dit rapport wordt gewerkt met een vaste meteorologie (2017).

¹⁸ <https://www.vmm.be/lucht/stikstof/stikstofdepositie>

- Voor alle relevante jaren (2016 – 2023) ligt de NH_x -bijdrage boven deze van de lineaire en exponentiële trendlijnen 2015 – toetspunt 2030. Bij een aangehouden trend, liggen de deposities in 2030 dus hoger dan de deposities voorzien in het toetspunt 2030.


4.2.2 Trends van de totale depositie

Bij het onderzoeken van de evoluties van de depositie op Vlaamse habitats, focussen we eerst op de totale stikstofdepositie. Met de totale depositie verwijzen we hierbij naar de deposities gerelateerd aan alle bronnen, zowel in Vlaanderen als het buitenland¹⁹. Onder de stikstofdepositie verstaan we de som van de NH_x - en de NO_y -bijdrage aan de depositie. We herhalen nog even dat we hier steeds gebruik maken van gekalibreerde data (zie sectie 2.2.1), en dat de resultaten uitgemiddeld zijn over de Vlaamse stikstofgevoelige habitats binnen SBZ-H (zie sectie 4.1.1).


Figuur 28 toont de evolutie van de totale gemiddelde stikstofdeposities op Vlaamse habitats. De jaarlijkse depositie vertoont een significant dalende trend, van 0,6 [0,5; 0,7] kgN/ha/j (lineaire trend) of 3,1 [2,5 ; 3,7] percent per jaar (exponentiële trend). Als deze trends ongewijzigd blijven de komende jaren, komen we in 2030 uit op een gemiddelde depositie van 12,4 [11,8 ; 13,0] kgN/ha/j (lineaire trend) of 13,3 [12,9 ; 13,8] kgN/ha/j (exponentiële trend). De inschatting van het toetspunt 2030 ligt op 13 kgN/ha/j. Het toetspunt 2030 is dus zowel bij een verderzetting van de lineaire trend als de exponentiële uit de periode 2015 – 2023 bereikbaar.

¹⁹ Met buitenlandse deposities bedoelen we in het huidige rapport alle deposities die gerelateerd zijn aan emissies die buiten Vlaanderen gebeuren. Dit is dus inclusief de emissies van Brussel en Wallonië en deze van vaarroutes in internationale wateren.

Samengevat tonen deze resultaten aan dat de trend voor de totale gemiddelde deposities dus het gevolg is van een beperkte daling van de NH_x -deposities, welke gecompenseerd wordt door een sterke daling van de NO_y -deposities, waarbij het echter onzeker is of de daling van deze laatste bijdrage even groot kan blijven in de toekomst. We herhalen hier dat we in deze sectie wel enkel de depositie uitgemiddeld over de habitats binnen SBZ-H bekijken. In een volgende sectie (4.3.1) onderzoeken we of deze conclusies ongewijzigd blijven als we de oefening herhalen voor elke VLOPS rooster cel apart.




Figuur 29: Verloop van de totale (VL + buitenland) jaarlijkse NO_y -deposities gemiddeld over habitats in Vlaanderen (in kg N/ha/j). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse deposities voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de deposities volgens een lineaire respectievelijk exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.



4.2.3 Trends van de Vlaamse totale depositie

In de vorige sectie bekeken we de totale stikstofdepositie, welke zowel afkomstig is van Vlaamse als buitenlandse bronnen. In deze sectie tonen we dezelfde figuren, maar dan enkel voor de deposities afkomstig van emissies in Vlaanderen. We bekijken opnieuw de stikstofdepositie (NO_y en NH_x tezamen) en beide bijdrages apart.


Figuur 31 toont de evolutie van de Vlaamse stikstofdeposities op Vlaamse habitats. De jaarlijkse depositie vertoont een significant dalende trend van 0,27 [0,22; 0,32] kgN/ha/j (lineaire trend) of 3,0 [2,4; 3,7] percent per jaar (exponentiële trend). Als deze trends ongewijzigd blijven de komende jaren, komen we in 2030 uit op een gemiddelde depositie van 5,8 [5,5; 6,1] kgN/ha/j (lineaire trend) of 6,2 [5,9; 6,4] kgN/ha/j (exponentiële trend). De inschattingen van het toetspunt 2030 ligt op 5,2 kgN/ha/j. Het toetspunt 2030 wordt dus zowel bij een verderzetting van de lineaire trend als de exponentiële uit de periode 2015 – 2023 niet gehaald, zelfs niet als rekening gehouden wordt met het betrouwbaarheidsinterval. Er zijn dus extra inspanningen nodig bovenop de historische trend om de depositiewaarde overeenkomende met het toetspunt 2030 te halen. We dienen hierbij op te merken dat de historische deposities de periode voor de inwerkingtreding van het stikstofdecreet bevatten, en dat de decretale maatregelen nog niet doorwerken in de huidige trends.



Figuur 31: Verloop van de jaarlijkse Vlaamse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) gemiddeld over habitats in Vlaanderen (in kgN/ha/j). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse deposities voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de deposities volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Parse kruis: toetspunt voor 2030.


Het verschil tussen beide pollutanten wordt opnieuw geïllustreerd bij de vergelijking met het toetspunt voor 2030. Voor de NH_x -bijdrage bereiken we bij een verderzetting van de huidige lineaire of exponentiële trend in 2030 een prognose waarvan het betrouwbaarheidsinterval hoger is dan de waarde voor het toetspunt 2030. Voor ammoniak lijken dus nog extra inspanningen nodig te zijn om het toetspunt 2030 te behalen. Voor de NO_y -bijdrage observeren we het omgekeerde gedrag: bij een verderzetting van de huidige (lineaire of exponentiële) trend, ligt de waarde in 2030 onder deze van het toetspunt 2030. Er is hier wel meer onzekerheid op de prognose voor 2030, zoals reeds werd aangehaald bij de bespreking van de totale depositie.

pagina 48 van 97





Figuur 32: Verloop van de jaarlijkse Vlaamse NO_y-deposities gemiddeld over habitats in Vlaanderen (in kgN/ha/j). Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse deposities voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de deposities volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.

zijn minstens één grootteorde kleiner dan de deposities van de sector industrie. Zij dragen dus maar beperkt bij tot de totale industriële depositie. De trends van deze sectoren zijn gelijkend aan deze van de emissies. Voor energie wordt een significant dalende trend geobserveerd. Voor vluchtige stoffen en solventen is de jaarlijkse variatie heel groot, zodat er een grote onzekerheid is op de trend. De trend is wel significant dalend voor beide sectoren.



Figuur 34: Verloop van de jaarlijkse Vlaamse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) gemiddeld over habitats in Vlaanderen voor de sector Industrie (sector B) (in kg N/ha/j). Zwarte punten: gemodelleerde jaarlijkse deposities voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de depositie volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.






Figuur 36: Verloop van de jaarlijkse Vlaamse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) gemiddeld over habitats in Vlaanderen voor de sector Vluchtige stoffen (sector D) (in kg N/ha/j). Zwarte punten: gemodelleerde jaarlijkse deposities voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de depositie volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Omdat emissies voor stationaire NO_x -bronnen van sector B naar sector D en E verhuizen, is de verandering van deposities binnen de sectorenluchtige stoffen en solventen relatief groot ten opzichte van vorige rapportering. De historische reeks is opnieuw berekend maar een aanpassing van toetspunt 2030 is momenteel niet mogelijk. Om deze reden wordt er geen toetspunt getoond.

4.2.4.1.2 Transportsectoren


Vervolgens focussen we op de deposities van de transportsectoren: wegverkeer (GNFR sector F, Figuur 38), scheepvaart (GNFR sector G, Figuur 39), luchtvaart (GNFR sector H, Figuur 40) en offroad verkeer (GNFR sector I, Figuur 41). De deposities van al deze sectoren vertonen significante, sterke dalingen, al zijn er bij een aantal sectoren wel een paar kanttekingen te plaatsen.

De deposities van wegverkeer dalen zeer sterk met 0,12 [0,07 ; 0,16] kg N/ha per jaar (lineaire trend) of met 11 [6 ; 15] percent per jaar (exponentiële trend). Deze sterke dalende trend is een doorslag van de sterk dalende trend in emissies, en we dienen hier dus dezelfde bemerkingen te plaatsen als voor de emissies. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat de huidige dalende trend in emissies zich onveranderd verderzet, is dit ook voor de deposities onwaarschijnlijk. Opnieuw zien we dat een verderzetting van de lineaire trend leidt tot negatieve deposities in de nabije toekomst, wat natuurlijk geen realistische situatie is. De exponentiële trend leidt (logischerwijze) wel tot een inschatting van positieve deposities, maar ook deze komt met een grote onzekerheid. Indien we, ondanks al deze onzekerheden, toch uitgaan van een extrapolatie naar de toekomst op basis van de historische exponentiële trend²⁰, vinden we dat de prognose voor 2030 in lijn ligt met het toetspunt.




Figuur 38: Verloop van de jaarlijkse Vlaamse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) gemiddeld over habitats in Vlaanderen voor de sector Wegverkeer (sector F) (in kg N/ha/j). Zwarte punten: gemodelleerde jaarlijkse deposities voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de depositie volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.

²⁰ Het is evident dat het gebruik van de lineaire trend zinloos is voor deze sector.



Figuur 39: Verloop van de jaarlijkse Vlaamse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) gemiddeld over habitats in Vlaanderen voor de sector Scheepvaart (sector G) (in kg N/ha/j). Zwarte punten: gemodelleerde jaarlijkse deposities voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de depositie volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.


De sector luchtvaart levert slechts een zeer beperkte bijdrage aan de Vlaamse deposities gemiddeld over habitats in Vlaanderen. Zoals reeds opgemerkt bij de bespreking van de emissies, is de historische trend bij deze sector sterk beïnvloed door de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus in te dijken, waardoor de deposities in 2020 en 2021 veel lager zijn dan deze in 2019, en ook de deposities van 2022 en 2023 nog lager dan die van 2019 liggen. Het is moeilijk om op basis van de periode 2015 – 2023 in te schatten hoe de langetermijnevolutie van deze sector eruit zal zien, aangezien een substantieel deel van deze periode (de jaren 2020 – 2022) als atypisch beschouwd kunnen worden. We doen in de huidige analyse dus geen uitspraak over een prognose naar 2030, maar wensen wel aan te halen dat in het jaar met de hoogste depositie (2019) deze depositie nog lager is dan deze van het toetspunt voor 2030.




Figuur 40: Verloop van de jaarlijkse Vlaamse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) gemiddeld over habitats in Vlaanderen voor de sector Luchtvaart (sector H) (in kg N/ha/j). Zwarte punten: gemodelleerde jaarlijkse deposities voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de depositie volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.

2030, bereiken we prognoses die ongeveer 30% hoger zijn dan de deposities opgenomen in het toetspunt 2030.


Voor de deposities gerelateerd aan de andere landbouwemissies bevat het betrouwbaarheidsinterval van de lineaire trend het getal nul, en dus is de trend niet significant dalend. Concreet vinden we een trend van 0,03 [-0.002 ; 0,06] kg N/ ha per jaar (lineaire trend) of 1,2 [-0.06 ; 2,4] percent per jaar (exponentiële trend). Zowel een volgehouden lineaire als een volgehouden exponentiële trend leiden in 2030 tot een prognose die meer dan 50% boven de deposities van het toetspunt 2030 ligt.



Figuur 42: Verloop van de jaarlijkse Vlaamse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) gemiddeld over habitats in Vlaanderen voor de sector Stallen (sector K) (in kg N/ha/j). Zwarte punten: gemodelleerde jaarlijkse deposities voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de depositie volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.



Figuur 44: Verloop van de jaarlijkse Vlaamse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) gemiddeld over habitats in Vlaanderen voor de sector Andere Stationaire Energiebronnen (sector C) (in kg N/ha/j). Zwarte punten: gemodelleerde jaarlijkse deposities voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de depositie volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.



4.3 RUIMTELIJK-TEMPORELE ANALYSE

In sectie 4.2 bespraken we de evolutie van de depositie gemiddeld over de Vlaamse habitats in SBZ-H. Zoals reeds aangehaald in deze sectie, geven de trends uit deze temporele analyse enkel een globaal beeld van de depositie op habitats in Vlaanderen. In de ruimtelijk-temporele analyse in deze sectie brengen we ook het ruimtelijke aspect van de depositietrends in beeld, we bekijken dus hoe de temporele trends verschillen van locatie tot locatie in Vlaanderen.


Concreet bepalen we voor elke 1 km bij 1 km VLOPS rooster cel de waarde van de trend en de p-waarde die uitdrukt hoe (on)zeker het teken van de trend is. We verwijzen naar bijlage B.2 voor een gedetailleerde bespreking van de methodologie. We focussen eerst opnieuw op de totale (Vlaamse + buitenlandse) stikstofdepositie (NO_y en NH_x opgeteld), en bekijken nadien de Vlaamse bijdrage en de bijdrage van beide polluenten apart.

4.3.1 Trends van de totale depositie


In de bovenste kaart in Figuur 46 vinden we de lineaire trend in stikstofdepositie tussen 2015 en 2023 voor elke VLOPS rooster cel. Negatieve waarden (blauwe tinten) wijzen op een dalende trend van de stikstofdepositie in die periode, positieve waarden op een stijging (geel-rode tinten). De blauwe kleuren overheersen op de kaart en geven aan dat er over het algemeen een dalende trend wordt waargenomen over de periode 2015 – 2023. Het feit dat het wegenspatroon duidelijk zichtbaar is wijst erop dat de daling in emissies van het wegverkeer hierin een belangrijke rol speelt. Enkel lokaal vinden we rooster cellen met toename van de deposities.

Deze trendkaart moet echter samen bekeken worden met de onderste kaart in Figuur 46, die de p-waarde van de trend toont. We kunnen de trends immers enkel interpreteren als we ook in rekening brengen hoe significant ze zijn. Een trend gecombineerd met een hoge p-waarde (vale kleuren) wijst op sterke schommelingen van jaar tot jaar in de stikstofdepositie, en dus op een statistisch zwakke trend, terwijl een trend gecombineerd met een lage p-waarde (heldere kleuren) wel op een statistisch significant sterke trend wijst. De figuur toont dat de dalende trend op de meeste locaties significant is ($p < 0,05$), terwijl dit maar op een beperkt aantal locaties het geval is voor de stijgende trend. We kunnen deze analyse ook kwantificeren. Tabel 2 geeft een overzicht van de richting van de trend en de bijhorende significantie voor alle VLOPS-rooster cellen. Voor ongeveer 99,8% van de Vlaamse oppervlakte is sprake van een dalende trend waarvan 99,2% significant is (minstens $p < 0,05$, 98,6% heeft $p < 0,01$). Voor 0,2% van de oppervlakte is er een stijgende trend, maar daarvan is maar 0,17% significant (minstens $p < 0,05$, 0,16% heeft $p < 0,01$). Tabel 3 geeft een gelijkaardige analyse, maar dan enkel voor gebieden binnen stikstofgevoelige habitats binnen SBZ-H's. Een vergelijking met Tabel 2 wijst op gelijkaardige resultaten voor de SBZ-H gebieden, al is de toestand net iets beter als enkel naar SBZ-H gebieden gekeken wordt.

Totale (VL + buitenland) stikstofdepositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$)
Meteo 2017, VLOPS25



Totale (VL + buitenland) stikstofdepositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$)
Meteo 2017, VLOPS25



Figuur 46: Lineaire trend van de totale (VL + buitenland) jaarlijkse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) op 1 km bij 1 km resolutie in de periode 2015 – 2023, zoals gemodelleerd door het VLOPS model. De bovenste figuur geeft de jaarlijkse trend (in kg N/ha/jaar), de onderste figuur visualiseert het teken van de trend en de p-waarde in één figuur. De dikke zwarte lijn geeft de buitengrenzen van Vlaanderen weer, de dunne lijnen de locaties van de Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H).

Tabel 2 : Analyse van de richting van de trend en de bijhorende significantie voor alle VLOPS gridcellen in Vlaanderen. De tabel geeft de resultaten voor de totale (Vlaanderen + buitenland) stikstofdepositie ($\text{NH}_x + \text{NO}_y$), de Vlaamse stikstofdepositie ($\text{NH}_x + \text{NO}_y$), de Vlaamse NH_x -depositie en de Vlaamse NO_y -depositie. Voor elk van de categorieën is zowel de oppervlakte in km^2 gegeven als het percentage van de oppervlakte dat in deze categorie valt.

		Oppervlakte (km^2)				Percentage van de oppervlakte			
		N depositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) Totaal	N depositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) Vlaanderen	NH_x Vlaanderen	NO_y Vlaanderen	N depositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) Totaal	N depositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) Vlaanderen	NH_x Vlaanderen	NO_y Vlaanderen
Dalende trend	$p < 0.01$	13962	12132	7618	14107	98.59%	85.67%	53.79%	99.61%
	$0.01 < p < 0.05$	90	985	2202	27	0.64%	6.96%	15.55%	0.19%
	$0.05 < p < 0.1$	31	266	898	3	0.22%	1.88%	6.34%	0.02%
	$p > 0.1$	47	594	2463	17	0.33%	4.19%	17.39%	0.12%
Stijgende trend	$p < 0.01$	7	14	52	1	0.05%	0.10%	0.37%	0.01%
	$0.01 < p < 0.05$	1	16	88	3	0.01%	0.11%	0.62%	0.02%
	$0.05 < p < 0.1$	2	14	58		0.01%	0.10%	0.41%	0.00%
	$p > 0.1$	22	141	783	4	0.16%	1.00%	5.53%	0.03%

Tabel 3 : Analyse van de richting van de trend en de bijhorende significantie voor de SBZ-H gebieden in Vlaanderen. De tabel geeft de resultaten voor de totale (Vlaanderen + buitenland) stikstofdepositie ($\text{NH}_x + \text{NO}_y$), de Vlaamse stikstofdepositie ($\text{NH}_x + \text{NO}_y$), de Vlaamse NH_x -depositie en de Vlaamse NO_y -depositie. Voor elk van de categorieën is zowel de oppervlakte in km^2 gegeven als het percentage van de oppervlakte dat in deze categorie valt. Enkel stikstofgevoelige SBZ-H gebieden zijn meegenomen in de analyse.


		Oppervlakte (km^2)				Percentage van de oppervlakte			
		N depositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) Totaal	N depositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) Vlaanderen	NH_x Vlaanderen	NO_y Vlaanderen	N depositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) Totaal	N depositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) Vlaanderen	NH_x Vlaanderen	NO_y Vlaanderen
Dalende trend	$p < 0.01$	743.0	611.5	445.4	743.5	99.87%	82.19%	59.86%	99.93%
	$0.01 < p < 0.05$	0.5	68.2	109.3	0.2	0.06%	9.16%	14.70%	0.03%
	$0.05 < p < 0.1$	0.1	19.6	47.7		0.02%	2.64%	6.42%	0.00%
	$p > 0.1$	0.3	41.1	106.3	0.2	0.04%	5.52%	14.29%	0.03%
Stijgende trend	$p < 0.01$		0.3	0.5		0.00%	0.04%	0.06%	0.00%
	$0.01 < p < 0.05$		0.4	1.3		0.00%	0.06%	0.17%	0.00%
	$0.05 < p < 0.1$			3.0		0.00%	0.00%	0.40%	0.00%
	$p > 0.1$	0.1	2.9	30.5	0.1	0.01%	0.39%	4.10%	0.01%

We kunnen de geobserveerde trends van de periode 2015 – 2023 ook vergelijken met de trend die nodig is om uit te komen bij de deposities van het toetspunt in 2030. We bekijken dit onder een aanname van lineaire trends, dus zowel de historische trend als de trend naar de beoogde depositie in 2030 worden aangenomen lineair te zijn. De analyse wordt getoond in Figuur 47. De figuur toont de afwijking tussen de geobserveerde en de nodige trend om het toetspunt 2030 te bereiken. Groene kleuren duiden op locaties waar de dalende trend beter dan nodig is, rode kleuren duiden op locaties waar de huidige trend niet volstaat om het toetspunt 2030 te halen. De felheid van de kleur (groen of rood) is een indicatie voor de afwijking met de beoogde trend. Aangezien de interpretatie van deze figuur vrij complex is, illustreren we ze hier ook met een theoretisch voorbeeld. We bekijken hierbij een locatie waar de totale depositie in 2015 30 kg N/ha/j bedraagt en waar het toetspunt voor 2030 10 kg N/ha/j bedraagt. Onder een lineaire aanname, dient de stikstofdepositie hier dus jaarlijks met 1.3 kg N /ha/j te dalen tussen 2015 en 2030. Indien op deze locatie de geobserveerde jaarlijkse (lineaire) daling in de periode 2015 – 2023 groter is dan 1.3 kg N/ha/j zal de locatie groen aangeduid worden op de kaart. De felheid van de groentint is bijkomend een maat voor het verschil tussen de beoogde en de geobserveerde trend. Indien de jaarlijkse geobserveerde daling bijvoorbeeld 2.4 kg N /ha/j bedraagt, wordt de locatie in het donkerste groen getoond op de kaart, want de afwijking tussen de geobserveerde en beoogde jaarlijkse trend is dan gelijk aan -1.1 kg N/ha/j. Als de geobserveerde jaarlijkse daling echter minder dan 1.3 kg N/ha/j bedraagt (of er een stijging wordt waargenomen), wordt de locatie in het rood gekleurd. Opnieuw is de felheid van het rood een maat voor de afwijking tussen de beoogde en de geobserveerde trend. Indien de jaarlijkse geobserveerde daling bijvoorbeeld slechts 0.2 kg N/ha/j bedraagt, wordt de gridcel in het donkerste rood gekleurd, want de afwijking tussen de geobserveerde en beoogde jaarlijkse trend is dan gelijk aan 1.1 kg N/ha/j. Ook voor het al dan niet behalen van de beoogde trend kan men een statistische test uitvoeren, volledig analoog aan de manier waarop deze test wordt uitgevoerd om te bepalen of het teken van de trend significant is (zie de methodologie in appendix B). In dit geval gaat men echter testen of het teken van de grootheid “geobserveerde trend min beoogde trend” significant groter of kleiner dan nul is. In de twee voorbeelden hierboven, gaan we dus na of de getallen -1.1 kg N/ha/j of 1.1 kg N/ha/j significant verschillend van nul zijn. In de verdere analyse van deze kaarten gebruiken we steeds een p-waarde van 0.05 om te bepalen of de trend al dan niet significant gunstig of ongunstig is.

Op basis van Figuur 47 concluderen we dat de er grote regionale verschillen zijn. In de ruime omgeving van Antwerpen en Brussel is de trend voldoende sterk dalend, net als in grote gebieden in midden-Limburg en Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen, het westen van Oost-Vlaanderen, de Kempen en Noord-Limburg is de trend dan weer niet voldoende. Op vele locaties is de trend ook niet significant als een p-waarde van 0.05 gebruikt wordt.

Tabel 4 kwantificeert de oppervlakte in stikstofgevoelige SBZ-H gebieden²¹ waar de trend significant lager of hoger ligt dan de beoogde trend, en waar de trend significant is. De trend is voor 41% van de SBZ-H oppervlakte significant lager dan de beoogde trend. Voor 3% van de oppervlakte is de trend significant hoger dan de beoogde trend, en voor de overige 55% is de trend niet significant verschillend van de beoogde trend.

²¹ We focussen hier enkel op stikstofgevoelige SBZ-H gebieden, aangezien de gewenste trend enkel op deze gebieden gehaald moet worden.




Figuur 47: Afwijking tussen de geobserveerde jaarlijkse lineaire trend in de periode 2015 – 2023 en de beoogde jaarlijkse lineaire trend op basis van de evolutie tussen 2015 en het toetspunt 2030 voor de totale (VL + buitenland) jaarlijkse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) op 1 km bij 1 km resolutie in de periode, zoals gemodelleerd door het VLOPS model. Positieve waarden (rode locaties) duiden op locaties waar de beoogde trend een grotere daling / kleinere stijging voorziet dan de geobserveerde trend, en dus op locaties waar de doelstelling 2030 bij een aangehouden lineaire trend niet gehaald wordt. Negatieve waarden / groene locaties duiden het omgekeerde gedrag aan. Gridcellen met zwarte punten in duiden op locaties waar de afwijking tussen beide trends niet significant is ($p > 0.05$). De dikke zwarte lijn geeft de buitengrenzen van Vlaanderen weer, de dunne lijnen de locaties van de Habitatrictlijngebieden (SBZ-H).

Tabel 4 : Analyse van de afwijking tussen de geobserveerde en beoogde trend voor de SBZ-H gebieden in Vlaanderen. De tabel geeft de resultaten voor de totale (Vlaanderen + buitenland) stikstofdepositie ($\text{NH}_x + \text{NO}_y$), de Vlaamse stikstofdepositie ($\text{NH}_x + \text{NO}_y$), de Vlaamse NH_x -depositie en de Vlaamse NO_y -depositie. Voor elk van de categorieën is zowel de oppervlakte in km^2 gegeven als het percentage van de oppervlakte dat in deze categorie valt. Enkel stikstofgevoelige SBZ-H gebieden zijn meegenomen in de analyse.

	Oppervlakte (km^2)				Percentage van de oppervlakte			
	N depositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) Totaal	N depositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) Vlaanderen	NH_x Vlaanderen	NO_y Vlaanderen	N depositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) Totaal	N depositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) Vlaanderen	NH_x Vlaanderen	NO_y Vlaanderen
Geobserveerde trend significant ($p < 0.05$) onder de beoogde trend	307	78	3	741	41.2%	10.5%	0.4%	99.6%
Geobserveerde trend significant ($p < 0.05$) boven de beoogde trend	25	184	520	0	3.4%	24.7%	69.9%	0%
Trend niet significant verschillend van de beoogde trend	412	482	221	3	55.4%	64.8%	29.8%	0.4%


4.3.2 Trends van de Vlaamse depositie

In de vorige sectie bekeken we de totale stikstofdepositie, welke zowel afkomstig is van Vlaamse als buitenlandse bronnen. In deze sectie tonen we dezelfde figuren, maar dan enkel voor de deposities afkomstig van emissies in Vlaanderen.



Figuur 48: Lineaire trend van de Vlaamse jaarlijkse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) op 1 km bij 1 km resolutie in de periode 2015 – 2023, zoals gemodelleerd door het VLOPS model. De bovenste figuur geeft de jaarlijkse trend (in kg N/ha/jaar), de onderste figuur visualiseert het teken van de trend en de p-waarde in één figuur. De dikke zwarte lijn geeft de buitengrenzen van Vlaanderen weer, de dunne lijnen de locaties van de Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H).

De figuur met de p-waardes voor de Vlaamse deposities (onderste figuur in Figuur 48) heeft veel meer valse kleuren dan de figuur met de p-waarde voor de totale deposities (onderste figuur in Figuur 46). Dit wijst op een grotere onzekerheid in de trend bij de Vlaamse deposities in vergelijking met de totale deposities. We zien zowel meer gridcellen met een niet-significante stijgende trend (wat nauwelijks voorkwam bij de totale depositie) als meer gridcellen waarbij de dalende trend niet significant is. Voor ongeveer 98,7% van de Vlaamse oppervlakte is nog steeds sprake van een dalende trend, maar slechts 92,6% is significant (minstens $p < 0,05$, 85,7% heeft $p < 0,01$). Voor 1,3% van de oppervlakte is er een stijgende trend, daarvan is 1,1% significant (minstens $p < 0,05$, 1,0% heeft $p < 0,01$).



Opnieuw kunnen we de geobserveerde trends van de periode 2015 – 2023 vergelijken met de trend die nodig is om, vertrekkende van de in 2015 geobserveerde deposities, uit te komen bij de deposities van het toetspunt in 2030. Figuur 49 toont dit resultaat. In vergelijking met de figuur voor de totale (Vlaanderen + buitenland) deposities (Figuur 47) is de trend voor de Vlaamse deposities een stuk minder gunstig. Er zijn veel meer roosterzellen en regio's met een ongunstige trend, en de afstand tot de beoogde trend is ook groter op locaties waar de trend van de totale depositie al ongunstig was. Deze analyse geeft aan dat de buitenlandse deposities een gunstiger traject volgen dan aangenomen is bij het opstellen van het toetspunt, maar dat anderzijds de Vlaamse deposities op de meeste locaties trends volgen die niet volstaan om het toetspunt 2030 te bereiken.

Eenzelfde beeld wordt bevestigd door Tabel 4. Als enkel de Vlaamse deposities worden bekeken, ligt de trend slechts voor 11% van de SBZ-H oppervlakte onder de beoogde trend (in vergelijking met 41% als de totale deposities bekeken worden). Voor 25% van de oppervlakte ligt de trend significant boven de beoogde trend, en voor 65% van de oppervlakte is de trend niet significant verschillend van de beoogde trend.

4.3.3 Trends van de Vlaamse NO_y - en NH_x -deposities



In een volgende stap bekijken we de NO_y - (Figuur 50) en NH_x -bijdrage (Figuur 51) aan de Vlaamse depositie. De onderliggende data wordt ook samengevat in Tabel 2.

Op de kaart met de NO_y -bijdrage zijn bijna enkel dalingen te zien (blauwe kleuren op de bovenste kaart), en de trend is voor zowat alle locaties significant (donkere kleuren op de onderste kaart). Concreet is er een daling voor 99,94% van de roosterzellen, en deze trend is voor 99,8% van de roosterzellen significant ($p < 0,05$). De stijging is slechts significant voor 0,06% van de roosterzellen ($p < 0,05$). Figuur 51 toont een ander beeld voor de NH_x -bijdrage. De blauwe tinten hebben nog steeds de bovenhand op de geel-rode kleuren, dus er zijn meer locaties met een daling dan een stijging van de depositie. De p-waarde kaart bevat wel veel valse kleuren, dus de trend is niet steeds significant. Concreet is er een daling voor 93,1% van de roosterzellen, maar deze trend is slechts voor 69,3% van de roosterzellen significant ($p < 0,05$). De stijging is significant voor slechts 5,9% van de roosterzellen ($p < 0,05$). In totaal is de trend voor ongeveer 75% van de gridcellen niet significant ($p > 0,05$).


Opnieuw kunnen we de geobserveerde trends van de periode 2015 – 2023 vergelijken met de trend die nodig is om, vertrekkende van de in 2015 geobserveerde deposities, uit te komen bij de deposities van het toetspunt in 2030. Figuur 52 geeft de analyse voor NO_y en NH_x . Opnieuw wordt een duidelijk verschil voor de bijdrage van beide polluenten geobserveerd. De trend voor de NO_y -bijdrage is op de meeste locaties gunstig, en dit is duidelijk het geval voor de locaties met hoge NO_x -emissies (nabij wegen, steden en havengebieden). De trend voor de NH_x -bijdrage is op de meeste locaties ongunstig, en enkel in de haven van Antwerpen wordt lokaal een gunstige trend geobserveerd (als gevolg van de dalende emissies van een mestverwerker), maar de oppervlakte SBZ-H is hier beperkt. In beide gevallen is de trend op de meeste locaties in Vlaanderen significant. Indien enkel gekeken wordt naar de SBZ-H gebieden, is de trend voor NH_x bijdrages slechts op 0.4% van de oppervlaktes significant voldoende dalend, terwijl voor NO_y bijdrages de trend voor 99.6% van de oppervlaktes significant voldoende dalen is (zie Tabel 4).

Samenvattend vinden we duidelijk een andere trend voor de NO_y - dan voor de NH_x -bijdrage. Dit resultaat is een doorslag van de eerdere resultaten voor de emissietrends, en werd ook reeds geobserveerd bij de bespreking van de depositie gemiddeld over Vlaamse habitats.

Totale Vlaamse NO_y-depositie
Meteo 2017, VLOPS25




Totale Vlaamse NO_y-depositie
Meteo 2017, VLOPS25




Figuur 50: Lineaire trend van de Vlaamse NO_y-deposities op 1 km bij 1 km resolutie in de periode 2015 – 2023, zoals gemodelleerd door het VLOPS model. De bovenste figuur geeft de jaarlijkse trend (in kg/ha/jaar), de onderste figuur visualiseert het teken van de trend en de p-waarde in één figuur. De dikke zwarte lijn geeft de buitengrenzen van Vlaanderen weer, de dunne lijnen de locaties van de Natura 2000 gebieden.

Totale Vlaamse NH_x-depositie
Meteo 2017, VLOPS25




Totale Vlaamse NH_x-depositie
Meteo 2017, VLOPS25



Figuur 51: Lineaire trend van de Vlaamse NH_x-deposities op 1 km bij 1 km resolutie in de periode 2015 – 2023, zoals gemodelleerd door het VLOPS model. De bovenste figuur geeft de jaarlijkse trend (in kg/ha/jaar), de onderste figuur visualiseert het teken van de trend en de p-waarde in één figuur. De dikke zwarte lijn geeft de buitengrenzen van Vlaanderen weer, de dunne lijnen de locaties van de Natura 2000 gebieden.

Afwijking tov. beoogde trend (kg N/ha/jaar)

<-1	-0.25 - -0.1	-0.05 - 0.05	0.1 - 0.25	0.5 - 1
-1 - -0.5	-0.1 - -0.05	0.05 - 0.1	0.25 - 0.5	>1
-0.5 - -0.25				



pagina 74 van 97


4.4 BIJKOMENDE ANALYSES

4.4.1 Depositie-uitwisseling met (Zuid-)Nederland

4.4.1.1 Effect van Vlaamse bronnen op Zuid-Nederland

De depositieberekeningen uitgevoerd in het kader van de analyses in dit rapport beperken zich niet tot depositie op het Vlaams Gewest. De depositie op de drie Nederlandse grensprovincies (Zeeland, Noord-Brabant, (Nederlands) Limburg) werd eveneens doorgerekend. Dat laat toe om een trendanalyse door te voeren van de depositiebijdrage vanuit Vlaanderen op het zuiden van Nederland.


Figuur 53 toont de trend en de bijhorende p-waarde van de Vlaamse stikstofdeposities op de drie zuidelijkste provincies in Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De trend is overal dalend (enkel blauwe kleuren), en op bijna alle plaatsen is de trend ook significant ($p < 0,05$). Enkel voor een beperkt aantal gridcellen in de onmiddellijke omgeving van de Vlaams-Nederlandse grens is de trend niet significant.




4.4.1.2 Effect van Nederlandse bronnen op Vlaanderen

In de vorige sectie bespraken we de impact van de Vlaamse emissies op Nederland. Met de resultaten van de VLOPS-modelleringen uitgevoerd in het kader van dit rapport kunnen we ook onderzoeken wat de impact van de Nederlandse emissies op de deposities in Vlaanderen is. We kunnen dit zowel bekijken volgens een louter temporele analyse, als volgens een ruimtelijk-temporele analyse.

De temporele analyse in Figuur 54 toont een significant dalende trend voor de gemiddelde Nederlandse depositie op Vlaamse habitats (lineaire dalende trend van 0,07 [0,04 ; 0,09] kg N/ha per jaar, exponentieel dalende trend van 2,4 [1,5 ; 3,3] percent per jaar). Als deze trend wordt verdergezet, liggen de Nederlandse deposities onder de waarde uit het toetspunt 2030, welke gebaseerd is op de Nederlandse emissieprognoses voor 2030, opgesteld door de maatregelen die vastliggen in het vastgesteld beleid toe te passen op de historische emissies. De huidige trend is dus in lijn met deze vooropgesteld in het Nederlandse beleidsplan. De ruimtelijk-temporele analyse in Figuur 55 geeft verder aan dat de Nederlandse depositie in elke rooster cel in Vlaanderen dalende is, en deze trend bijna overal significant is ($p < 0,05$).



Figuur 54: Verloop van de jaarlijkse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) gemiddeld over habitats in Vlaanderen veroorzaakt door emissies in Nederland (in kg N/ha). Zwarte punten: gemodelleerde jaarlijkse deposities voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de depositie volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Paarse kruis: toetspunt voor 2030.




4.4.2 Effect van meteorologie

De standaardberekeningen in dit rapport zijn gebaseerd op een vaste meteorologie. Voor elk jaar wordt daarbij gebruik gemaakt van de meteorologische data voor 2017, zodat de depositietrends een duidelijk beeld geven van de evolutie veroorzaakt door veranderingen in de emissies. In deze bijkomende analyse wordt onderzocht wat de invloed is van meteorologie op de trendanalyses voor deposities. We vervangen hierbij voor elk jaar de meteorologische data voor 2017 met de meteorologische data voor het jaar dat we doorrekenen. Op deze manier kunnen we zien hoe de trend in de emissies en deposities in verhouding gebracht kan worden ten opzichte van de variatie in de meteorologie. We herhalen de analyse voor de totale stikstofdepositie ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$), en dit zowel voor de gemiddelde waarde over de Vlaamse habitats als voor de ruimtelijk-temporele analyse.


In alle analyses worden de VLOPS resultaten gekalibreerd, en we maken hierbij steeds gebruik van de kalibratiefactoren op basis van het meteojaar.

Figuur 56 toont de impact van de jaarspecifieke meteo op de depositie. Voor elk jaar toont de figuur het verschil tussen een berekening enerzijds op basis van de meteo voor 2017 en anderzijds op basis van de jaarspecifieke meteo, en dit voor de totale (Vlaanderen + buitenland) depositie gemiddeld over Vlaamse habitats. Logischerwijze ligt het datapunt voor 2017 op nul, want in dit geval wordt bij beide berekeningen dezelfde meteo gebruikt. De plot toont verder aan dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de verschillende meteojaren. De meteo van 2018, 2019, 2022 en 2023 leidt tot deposities die in lijn liggen met deze op basis van meteo 2017. Meteo 2021 leidt tot hogere deposities, en meteo 2015, 2016 en 2020 leiden tot lagere deposities. Vooral het jaar 2015 is hierbij een uitzondering met een bijzonder gunstige meteo.


We zijn in deze studie echter eerder geïnteresseerd in de evolutie van de depositie, dan in de absolute depositie. Figuur 57 toont de evolutie van de gemiddelde totale (Vlaamse + buitenlandse) depositie op de habitats, en Figuur 58 de kaarten met de trend en p-waarde als voor elk jaar gebruik gemaakt wordt van de meteorologie van dat specifieke jaar. Deze figuren zijn dus de tegenhanger van respectievelijk Figuur 28 en Figuur 46, die dezelfde resultaten bevatten, maar dan op basis van een vast meteojaar (2017) voor alle jaartallen. De resultaten tonen aan dat het gebruik van jaarspecifieke meteorologie een belangrijk effect heeft op de uitgevoerde analyse. Toch zien we de dalende trend in deposities ook terug in de resultaten indien we gebruik maken van de jaarspecifieke meteorologie, zij het dat de trend veel minder uitgesproken is ($-0,36 \text{ kg/ha/j}$ versus -0.59 kg/ha/j met constante meteo) en een stuk meer gemaskeerd wordt door de jaarlijkse variabiliteit. Door deze jaarlijkse variabiliteit is de trend ook niet langer significant dalend, aangezien de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval een stijging aangeeft. Aangezien er weinig reden is om aan te nemen dat de meteorologie standaard verschuift naar een meer ongunstige situatie (meer depositie voor zelfde emissies) kunnen we dus vermoeden dat, indien de trend in emissies de komende jaren aanhoudt, de significant (dalende) trend in deposities ook terug duidelijker zichtbaar zou moeten worden bij gebruik van de jaarspecifieke meteo.



Figuur 56: Impact van het gebruik van jaarspecifieke meteo in plaats van meteo 2017. De plot toont het verschil in de jaarlijkse totale (Vlaanderen + buitenland) N-depositie ($\text{NO}_x + \text{NH}_x$) gemiddeld over de Vlaamse habitats op basis van VLOPS24, tussen enerzijds een berekening op basis van meteo 2017 en anderzijds de jaarspecifieke meteo. Positieve waarden: de depositie berekend op basis van de jaarspecifieke meteo is lager dan deze bij meteo 2017 (en dus gaat het om een gunstig meteojaar). De plot toont, net zoals alle andere plots in dit rapport, de resultaten na kalibratie.



Figuur 57: Verloop van de totale (VL + buitenland) jaarlijkse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) gemiddeld over habitats in Vlaanderen (in kg N/ha/j), indien voor elk jaar gebruik gemaakt wordt van de meteo voor dat jaar. Zwarte punten: gerapporteerde jaarlijkse deposities voor de historische jaren. Groene en oranje lijn: lineaire respectievelijk exponentiële regressie door de punten. Groene en oranje punt in 2030: projectie van de deposities volgens een lineaire respectievelijke exponentiële trend, met betrouwbaarheidsinterval (2-sigma onzekerheid). Deze figuur is de tegenhanger van Figuur 28, maar dan op basis van jaarspecifieke meteorologie.



Figuur 58: Lineaire trend van de totale (VL + buitenland) jaarlijkse stikstofdeposities ($\text{NO}_y + \text{NH}_x$) op 1 km bij 1 km resolutie in de periode 2015 – 2023, zoals gemodelleerd door het VLOPS model, indien voor elk jaar gebruik gemaakt wordt van de meteo voor dat jaar. De bovenste figuur geeft de jaarlijkse trend (in kg/ha/jaar), de onderste figuur visualiseert het teken van de trend en de p-waarde in één figuur. Deze figuur is de tegenhanger van Figuur 46, maar dan op basis van jaarspecifieke meteorologie.

5 CONCLUSIE

In dit rapport wordt een uitgebreide ruimtelijk-temporele analyse gepresenteerd van de stikstofemissies en -deposities in Vlaanderen gedurende de periode 2015-2023. Het rapport is opgesteld als een leidraad om de evolutie van de deposities en emissies ten aanzien van de doelstellingen uit het stikstofdecreet van januari 2024 te evalueren.

Voor de periode 2015–2023 worden de jaarlijkse emissies van stikstofdioxide (NO_x) en ammoniak (NH₃) voor alle relevante sectoren in kaart gebracht. Een trendanalyse onthult hoe de emissies zijn geëvolueerd en of de huidige trends overeenkomen met het traject dat nodig is om de doelstellingen voor 2030 volgens het stikstofdecreet te behalen. Daarnaast wordt de jaarlijkse stikstofdepositie gemodelleerd op een resolutie van 1 km bij 1 km. Bij deze modellering worden andere parameters zoals meteorologische gegevens en kalibratiefactoren constant gehouden zodat kan worden ingeschat of en waar er sprake is van een netto depositiedaling enkel veroorzaakt door een verandering in de emissies. Daarnaast wordt een gevoeligheidsstudie uitgevoerd die het effect van de gebruikte meteorologische gegevens kwantificeert, door te werken met jaarspecifieke meteorologie.

BIJLAGE A: TOETSPUNT 2030

De trendanalyse in dit rapport onderzoekt hoe de emissies en deposities in de recente jaren evolueerden en wat de verwachtingen zijn voor 2030 als de huidige trends zich doorzetten. De extrapolatie naar 2030 wordt vergeleken met een toetspunt voor 2030, zowel voor emissies als deposities, zodat men kan inschatten hoe de huidige trends zich verhouden tot de verwachte evolutie volgens het stikstofdecreet. In deze bijlage bespreken we in detail hoe dit toetspunt gedefinieerd werd²².

De onderliggende basis voor dit toetspunt zijn de stikstofdoelstellingen uit het stikstofdecreet. In het decreet zijn volgende doelstellingen expliciet²³ opgenomen, uitgedrukt als jaarlijkse emissie van het Vlaamse Gewest tegen uiterlijk 31 december 2030:

- Totale stikstofoxide emissies (NO_x): 21 800 ton N
- Totale ammoniak emissies (NH₃): 21 300 ton N
- Stalemissies:
 - Ammoniak emissies varkens: 5701 ton NH₃
 - Ammoniak emissies pluimvee: 2089 ton NH₃
 - Ammoniak emissies vleesvee: 2794 ton NH₃
 - Ammoniak emissies mestkalveren: 438 ton NH₃
 - Ammoniak emissies melkvee: 3271 ton NH₃

Het decreet specificeert, buiten de getallen voor de ammoniakemissies voor de stallen, niet verder hoe de totale ammoniak en stikstofoxide emissies samengesteld zijn, en geeft geen expliciete richtgetallen voor de andere sectoren. Daarom kijken we naar de data die onderliggend aan het stikstofdecreet zijn, namelijk de emissies die gebruikt werden in het G8-scenario in het Plan-MER PAS. Voor de (deel)sectoren waarbij er expliciete emissietotalen in het stikstofdecreet staan (zie het lijstje hierboven), komen de emissietotalen uit het G8-scenario immers overeen met deze uit het stikstofdecreet. Voor de andere sectoren bevat het G8-scenario aanvullende gegevens die in lijn zijn met de totalen voor NO_x en NH₃ uit het stikstofdecreet. Zoals we in de volgende paragraaf uitgebreid documenteren, is het echter om diverse redenen niet mogelijk om rechtstreeks de prognose 2030 uit het Plan-MER PAS over te nemen. Vandaar dat we in deze bijlage een nieuw toetspunt definiëren, dat qua emissietotalen aansluit bij de totalen van het G8-scenario uit het Plan-MER PAS²⁴. Voor de sectoren waarvoor er expliciete emissietotalen zijn opgenomen in het stikstofdecreet, zal dit toetspunt dan ook automatisch aansluiten bij de sectortotalen uit het stikstofdecreet.

We willen hier ten slotte ook nog benadrukken dat dit toetspunt enkel dient om de huidige trends mee te vergelijken. Het toetspunt is geenszins een inschatting van wat de emissies in 2030 exact zullen

²² Bemerk dat het toetspunt herberekend werd t.o.v. de vorige versie van het rapport. Dit om de meest recente kennis op het moment van de berekening van het toetspunt op te nemen. De recent beschikbare informatie i.k.v. het maatregelenpakket werd in rekening gebracht zoals de vrijstelling van biobedrijven en de recente gegevens over nulbemesting. Daarnaast werd gerekend met de recentste modellen. De nieuwe VLOPS versie zorgt voor andere piekbelasters en kleine bedrijven en de aanpassingen in EMAV3.0 met wijziging van emissies 2021 voor een aantal deelsectoren als gevolg.

²³ Bemerk dat niet alle doelstellingen in dezelfde eenheid worden uitgedrukt. De ene keer spreekt het decreet over ammoniakemissies, de andere keer over stikstofemissies uit ammoniak of stikstofoxides. Voor de eenvoud werken we in deze tekst in het vervolg enkel met de stikstofemissies.

²⁴ In het vervolg van het document zullen we kortweg verwijzen naar de emissies uit het Plan-MER PAS als we de emissies van het G8-scenario uit het Plan-MER PAS bedoelen.

zijn vermits er geen nieuwe emissieprognoses werden gebruikt, en het is ook geen voorafname voor toekomstige beleidsbeslissingen.

1.1 MOTIVERING VOOR HERSCHALING VAN HET TOETSPUNT 2030

We bepalen een update van de prognose uit het Plan-MER PAS, rekening houdende met volgende factoren. Sommige van deze factoren hebben enkel een invloed op de deposities, andere ook op de emissies:

- Voor de emissies geldt dat de indeling in (sub)sectoren uit het Plan-MER PAS niet langer overeenkomt met de indeling die wordt gebruikt voor de historische emissiereeksen. In het Plan-MER PAS werd gebruik gemaakt van de VLEM-indeling, die inmiddels is vervangen door de GNFR-sectorindeling die op Europese schaal wordt gehanteerd. Om de trends voor de verschillende sectoren te kunnen analyseren (zowel voor emissies als deposities), is het belangrijk dat dezelfde sectoren worden gebruikt in de historische jaren én in het toetspunt voor 2030.
- De onderliggende emissiemodellen werden aangepast. Dit geldt zowel voor het EMAM-model, dat de landbouwemissies voor Vlaanderen berekent, als voor het E-MAP-model, dat de Vlaamse emissies van alle sectoren verspreidt over Vlaanderen. Om de recente wijzigingen in de landbouwemissies en de geografische spreiding van alle emissies mee te nemen, is een aanpassing aan het toetspunt nodig. Deze aanpassing heeft geen invloed op de totale emissies uit het Plan-MER PAS, maar wijzigt wel de geografische spreiding ervan, wat op zijn beurt leidt tot een aanpassing van de berekende deposities.
- Voor deposities geldt dat het VLOPS-model, dat de concentraties en deposities berekent op basis van de emissies, meerdere keren is geüpdatet.
- Er is tenslotte ook een nieuw basisjaar voor de emissies gekozen in het stikstofdecreet (2021 in plaats van 2015 in het Plan-MER PAS) en een nieuw meteojaar aangenomen als gevolg van een expertenbeslissing (2017 in plaats van 2015). Dit heeft zowel een invloed op de emissieprognoses (want de maatregelen worden doorgevoerd op basis van een ander referentiejaar) als op de depositieberekening (want er wordt een ander meteojaar gebruikt).

Op basis van al deze argumenten werd beslist om het toetspunt 2030 te bepalen.

1.2 TOETSPUNT EMISSIES 2030

1.2.1 Vlaamse emissies

De algemene methodologie voor het bepalen van het nieuwe toetspunt 2030 is om emissietotalen in overeenstemming met het Plan-MER PAS te combineren met de meest recente inschattingen voor de spreidingspatronen in 2030 in de GNFR-indeling.

Aangezien er per sector en pollutant aanzienlijke verschillen zijn tussen de datasets die de meest recente inschatting geven voor de spreidingspatronen in 2030, zal de methodologie variëren per sector en pollutant. Het algemene basisconcept blijft echter hetzelfde voor elke sector en pollutant.

Kort samengevat gebruiken we voor landbouw NH₃-emissie spreidingspatronen opgesteld op basis van het toepassen van de maatregelen uit het stikstofdecreet op emissies voor het jaar 2021. Voor de niet-landbouwsectoren baseren we de NH₃- en NO_x-emissies op de spreidingspatronen voor 2030 uit reeds bestaande, recente doorrekeningen voor 2030. Voor NO_x-emissies in de landbouw wordt een hybride procedure uitgewerkt.

In de volgende paragrafen beschrijven we de bepaling van het toetspunt voor emissies in detail, gegroepeerd voor niet-landbouw (1.2.1.1) en landbouwsectoren (1.2.1.2).

1.2.1.1 Stikstofemissies niet-landbouw sectoren (sector A tem J)

Voor de niet-landbouw sectoren (alle sectoren behalve sector K en L, zie Tabel 5) vertrekken we van emissiegegevens zoals die te vinden zijn in het G8-scenario van het Plan-MER PAS²⁵ en combineren we deze met de meest recent beschikbare emissietotalen en spreidingspatronen per GNFR-sector voor 2030 uit E-MAP. Deze aanpak zorgt ervoor dat we de gegevens gebruiken in GNFR-formaat, waardoor een betere vergelijking met de emissies voor de historische jaren mogelijk is. Daarnaast komen de emissietotalen overeen met die van het Plan-MER PAS, aangezien vertrokken wordt van die totalen.

Aangezien de sectorindeling in beide datasets afwijkt van elkaar (VLEM in Plan-MER PAS en GNFR in de meest recente versie van E-MAP), moeten we sectoren soms groeperen om de combinatie te kunnen maken. In detail wordt volgende procedure gebruikt:

- Voor de transportsectoren (wegverkeer [F], scheepvaart [G] en luchtvaart [H]) is de link tussen de VLEM-sectoren en de GNFR-sector duidelijk, en is er dus geen samentelling nodig. We combineren hier beide datasets dus voor alle sectoren apart.
- Voor de overige sectoren (sectoren A, B, C, D, E, I, J) is er een minder duidelijke link tussen de GNFR- en VLEM-sectoren. De spreiding van deze sectoren gebeurt dus voor al deze sectoren samen (in één keer), m.a.w., het totaalcijfer voor deze sectoren samen uit het Plan-MER PAS wordt gespreid volgens het gewogen spreidingspatroon van deze sectoren samen.

1.2.1.2 Stikstofemissies landbouwsectoren (sector K en L)

Voor de landbouwsectoren maken we een onderscheid tussen NO_x en NH₃.

1.2.1.3 NH₃-emissies landbouw

Voor de ammoniakemissies van de landbouwsectoren combineren we de meest recente geografische spreiding van de emissies (op basis van de resultaten van EMAP 3.0 voor het jaar 2021) met de emissietotalen uit het Plan-MER PAS. Hiertoe worden in een eerste stap de emissies voor 2030 voor alle subsectoren bepaald door de maatregelen uit het stikstofdecreet toe te passen op de historische emissies voor 2021. De emissietotalen die op deze manier bekomen worden, wijken voor een aantal subsectoren echter sterk af van de inschattingen uit het Plan-MER PAS. Vandaar dat in een tweede stap de emissies per subsector herschaald worden, zodat de emissietotalen uit het Plan-MER PAS

²⁵ Bij de totalen uit het Plan-MER PAS verwijzen we steeds naar het scenario G8 uit het Plan-MER PAS.

terug bereikt worden. We beschrijven deze procedure in de volgende paragrafen, met een opsplitsing tussen sector K (stallen) en sector L (andere landbouw).

Stalemissies (sector K)

Voor de stalemissies (sector K) vertrekken we van de EMAV 3.0 emissies voor 2021 (Tabel 5, kolom 1), waarop we de bronmaatregelen uit het decreet toepassen:

- Toepassing van de regeling rond piekbelasters:
 - Voor de bepaling van piekbelasters worden op basis van de KDW's opgenomen in impactscore op 15 april 2025 (welke de KDW's zijn die gebruikt zijn in Plan-MER PAS) en VLOPS24 depositiesnelheden (op basis van emissies 2021, meteorologie 2017) alle IIOA ("Ingedeelde inrichting of activiteit") met een impactscore hoger dan of gelijk aan 50% weerhouden. Dit wijkt af van de bepalingen in het decreet, dat piekbelasters berekent op basis van de impactscores van 2020, 2021 en 2022, waarbij minimaal twee van de drie berekende impactscores hoger zijn dan of gelijk zijn aan 50%. Deze keuze is gemaakt om geen voorafname te doen op de identificatie van piekbelasters door de VLM. Voor de trendanalyse op emissie- en depositieniveau (VLOPS-niveau) is de impact van de piekbelasters beperkt, aangezien de totale emissies van de piekbelasters (140 ton N-NH₃/jaar) zeer klein zijn ten opzichte van de totale emissie van de sector K (ca. 12 100 ton N-NH₃/jaar in het toetspunt 2030).
 - De emissies van de piekbelasters in 2021 worden verder gereduceerd tot de impactscore minder dan 50% bedraagt.
- Stallen van kleinschalige bedrijven (jaaremissie van minder dan 500 kg NH₃ en een impactscore (berekend op basis van de KDW's opgenomen in impactscore op 15 april 2025, emissies 2021, meteorologie 2017 en VLOPS24 depositiesnelheden), lager dan of gelijk aan 0.025%) worden vrijgesteld van de generieke bronmaatregelen. De emissies 2021 worden dus behouden voor deze bedrijven.
- Biobedrijven waarvan de impactscore van het biogedeelte lager is dan 1% worden voor het biologische gedeelte vrijgesteld van generieke bronmaatregelen. De impactscore wordt hier berekend op basis van de KDW's gebruikt in Plan MER PAS, emissies 2021, meteorologie 2017 en VLOPS24 depositiesnelheden. Voor de trendanalyse op emissie- en depositieniveau (VLOPS-niveau) is de impact van de biobedrijven beperkt, aangezien de totale emissies van de piekbelasters (114 ton N-NH₃/jaar) zeer klein zijn ten opzichte van de totale emissie van de sector K (ca. 12 100 ton N-NH₃/jaar in het toetspunt 2030).
- Er zijn geen bronmaatregelen opgenomen voor stallen van andere diersoorten (paarden, geiten, schapen, etc.) in het decreet. De emissies 2021 van deze stallen worden dus behouden voor 2030.
- Toepassing van technieken om de ammoniakemissies van niet-AEA pluimveestallen te reduceren (toepassen van een reductie van 63,356%). Dit cijfer is gebaseerd op een daling van 8,39% van dit type stallen in het Luchtbeleidsplan en dan een extra daling van 60% op het resterende gedeelte.
- Toepassing van AEA-technieken op niet-AEA varkensstallen (toepassen van een reductie van 65,145%). Dit cijfer is gebaseerd op een daling van 12,86% van dit type stallen in het Luchtbeleidsplan en dan een extra daling van 60% op het resterende gedeelte.
- Reductie van emissies bij rundveestallen tot op het niveau van het Plan-MER PAS op deelsectorniveau (35% reductie voor melkvee, toename van 0.19% voor vleesvee en 33%

reductie voor mestkalveren)²⁶. Deze cijfers worden bekomen door de emissietotalen per deelsector voor 2021 berekend via EMAV 3.0 te vergelijken met de emissietotalen uit het Plan-MER PAS (zie Tabel 5), met inachtneming van de piekbelasterregeling. Bemerkt dat deze reductiepercentages afwijken van de percentages uit het stikstofdecreet. Dit hoeft echter niet te verbazen aangezien de reducties in het decreet bepaald zijn op basis van de periode 2015 – 2030, en de percentages hier bepaald zijn op basis van de periode 2021 - 2030. Daarnaast is ook een andere EMAV-versie gebruikt. De afwijkingen zijn dus gerelateerd aan een update in het emissiemodel en de evolutie die tussen 2015 en 2021 reeds heeft plaatsgevonden.

Tabel 5: Ammoniakemissies van stallen voor de verschillende diercategorieën (in ton N/jaar). De tabel geeft de totalen voor 2021 (kolom Totalen 2021), de totalen die bekomen worden door het toepassen van de maatregelen uit het stikstofdecreet op de historische emissies voor 2021 (kolom Herberekening), en de emissietotalen die zijn opgenomen in het ²⁷Plan-MER PAS (PAS G8). De voorlaatste kolom geeft weer welke extra aanpassingen zijn doorgevoerd zodat de waardes uit de herberekening overeenkomen met deze uit het Plan-MER PAS, en de laatste kolom kwantificeert het verschil tussen PAS G8 en de herberekening, waarbij negatieve cijfers aangeven dat PAS G8 een lager emissietotaal geeft.

Deelsector	Totalen 2021 (ton N/jaar)	Herberekening op basis van maatregelen in decreet (ton N/jaar)	PAS G8 (ton N/jaar)	Doorgevoerde aanpassing om PAS G8 te bereiken	Verskil tussen herberekening en G8
Andere dieren	347	347	248	Uniforme herschaling voor niet-kleinschalige bedrijven van deze categorie	-28,5%
Melkvee	4085	2694	2694		
Mestkalveren	534	361	361		
Vleesvee	2331	2301	2301		
Pluimvee	3370	2013	1720	Aanpassing emissiereductie-percentage voor niet-AEA stallen	-14.5%
Varkens	9953	4510	4695	Aanpassing emissiereductie-percentage voor niet-AEA stallen	+4.1%
Totaal	20620	12226	12019		

Na het toepassen van de maatregelen bekomen we de herberekende emissietotalen in Tabel 5, kolom 2. De tabel vergelijkt de emissietotalen per deelsector met deze uit het Plan-MER PAS. Hierbij valt meteen op dat voor een aantal deelsectoren de emissies sterk afwijken van de emissies die opgenomen zijn in het Plan-MER PAS. Deze verschillen zijn, net zoals de eerdere verschillen voor

²⁶ Bemerkt dat deze getallen (beperkt) afwijken van deze uit de vorige versie van het rapport. Doordat een meer recente VLOPS-versie gebruikt wordt (VLOPS24 in plaats van VLOPS23), zijn er wijzigingen in de piekbelasters en de kleine bedrijven. Daarnaast zijn ook de biobedrijven opgenomen.

²⁷ Bemerkt dat deze cijfers ook zijn opgenomen in het stikstofdecreet, maar daar vermeld worden in ton NH₃ per jaar.

In lijn met de algemene methodologie bij het opstellen van het toetspunt, brengen we de totalen van de emissies voor 2030 terug in lijn met het Plan-MER PAS. We voeren hiervoor een aantal extra aanpassingen door aan de emissieberekeningen en proberen om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de maatregelen uit het stikstofdecreet. We behouden daarom de vrijstelling voor kleine veehouderijen en AEA-stallen, en passen de reductiepercentages voor de niet-AEA stallen aan zodat de juiste totalen bekomen worden. Concreet betekent dit²⁸:

- Samenvattend besluiten we dat er geopteerd is om de NH₃-emissietotalen voor de stallen zo goed mogelijk in lijn te brengen met het Plan-MER PAS en het stikstofdecreet, maar wel te vertrekken van de spreidingspatronen uit de meest recente emissie-inschattingen. Finaal hebben we dus de totale emissies voor alle deelsectoren gelijk gebracht aan deze uit het Plan-MER PAS.

Bij de andere landbouwsectoren (sector L) wordt een onderscheid gemaakt tussen mestverwerkers en de andere deelsectoren.

²⁸ Bemerkt dat deze getallen (beperkt) afwijken van deze uit de vorige versie van het rapport. Doordat een meer recente VLOPS-versie gebruikt wordt (VLOPS24 in plaats van VLOPS23), zijn er wijzigingen in de piekbelasters en de kleine bedrijven. Daarnaast zijn ook de biobedrijven opgenomen.

volledige stopzetting voor de “oude” piekbelasters en een verplichte reductie van emissies voor de nieuwe piekbelasters, wat dus leidde tot lagere emissietotalen.

We passen hier opnieuw een verdere uniforme daling van de emissies toe, zodat de totalen uit het Plan-MER PAS bekomen worden. Deze berekening geeft aan dat de mestverwerkers die geen piekbelasters zijn, een reductie van 51% moeten verwezenlijken ten opzichte van de situatie in 2021, om finaal de doelstelling uit Plan-MER PAS te bekomen²⁹.

Tabel 6: Ammoniakemissies voor de mestverwerkers (in ton N). De tabel geeft de totalen voor de historische emissies voor 2021 (eerste kolom), de emissietotalen die bekomen worden als hier de piekbelasterregeling op wordt toegepast (tweede kolom) en de emissietotalen die zijn opgenomen in het Plan-MER PAS (PAS G8).

Deelsector	Historisch 2021 (ton N/jaar)	Historisch 2021, na toepassing piekbelasterregeling (ton N /jaar)	PAS G8 (ton N/jaar)
Mestverwerkers	803	624	373

Voor beweiden, uitrijden van dierlijk mest en kunstmest zijn geen bronmaatregelen gedefinieerd in het stikstofdecreet. Daarom gebruiken we voor deze deelsectoren een methodologie die gelijkend is aan deze voor de niet-landbouw sectoren. We vertrekken van de emissietotalen uit het Plan-MER PAS en combineren die met de meest recente spreidingspatronen uit E-MAP per deelsector. Wel wordt bij deze combinatie rekening gehouden met de maatregelen rond de groene bestemmingen.

1.2.1.4 NO_x-emissies landbouw

De methodologie voor de NO_x emissies voor de landbouwsectoren ligt sterk in lijn met de methodologie voor de NO_x emissies voor de niet-landbouw sectoren. We stellen een toetspunt op door de emissietotalen uit het Plan-MER PAS te combineren met de meest recente spreidingspatronen. Voor de NO_x-emissies van de sector landbouw is deze procedure echter wat gecompliceerder, aangezien de emissieprognoses uit de meest recente versie van E-MAP en het Plan-MER PAS opgesteld zijn op basis van een oudere EMAN-variant (versie 2.1), terwijl er in een meer recente EMAN-variant (versie 3.0) meer gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn. Meer concreet zijn er in EMAN-variant 3.0 extra inschattingen van andere stikstofverliezen voor stallen, en zijn emissies voor beweiden en mestverwerkers toegevoegd.

Om toch te starten van de meest recente gegevens, vertrekken we, voor de deelsectoren stallen, beweiden en mestverwerkers van de historische emissies voor 2021 i.p.v. de emissies uit E-MAP voor 2030, omdat ze met de meest recente EMAN-variant (versie 3.0) werden berekend (zie Tabel 7, kolom 1 voor de totalen). We brengen deze emissies in eerste instantie in lijn met de emissietotalen uit E-MAP voor 2030, en dit voor beide GNFR-sectoren apart (sector K, stallen, en sector L, andere landbouwemissies). Meer concreet worden volgende stappen uitgevoerd:

²⁹ Bemerk dat de mestverwerkers die wel piekbelaster zijn reeds een grotere reductie hebben ondergaan, en daarom worden vrijgesteld van deze extra maatregel.

1.2.2 Buitenlandse emissies

1.2.2.1 Nederland

De emissies voor Nederland zijn gebaseerd op gedetailleerde data aangeleverd door RIVM. De prognoses voor 2030 zijn afgeleid door de maatregelen die vastliggen in het vastgesteld beleid toe te passen op de historische emissies.

Meer in detail leverde RIVM in februari 2025 de historische emissies voor 2021 aan. Deze emissies worden gebruikt in de GCN (grootschalige concentratiekaarten Nederland³⁰) rapportering in 2024, en liggen ook aan de basis van de officiële rapportering aan Europa. De historische emissies worden aangeleverd in de specifieke GCN-sectoren (afval, bouw, consumenten, energie, HDO, industrie, landbouw en verkeer), maar RIVM leverde ook omzettingstabellen om de emissies om te zetten naar de GNFR-indeling. Bij de omzetting naar GNFR is er ook een verdere aggregatie gebeurd van niet-puntbronnen op resolutie 1 km, om zo het aantal records te verminderen (reductie orde ~50%). Deze omzetting heeft natuurlijk geen effect voor de emissietotalen, maar maakt wel de doorrekening naar deposities eenvoudiger en sneller.

Naast de historische emissies, leverde RIVM ook de prognose schaalfactoren van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving³¹) aan. Via deze factoren kunnen de ingeschatte emissies voor 2030 berekend worden uit de historische data voor 2021. Hierbij wordt uitgegaan van de variant “vastgesteld beleid”, welke de maatregelen bevat die reeds zijn opgenomen in het huidige beleid.

1.2.2.2 Niet-Nederland

Voor de niet-Nederlandse buitenlandse emissies worden de emissietotalen en spreidingspatronen uit E-MAP voor 2030 integraal overgenomen.

1.3 TOETSPUNT DEPOSITIES 2030

Het toetspunt deposities voor 2030 wordt bepaald door een VLOPS-doorrekening. Voor de trendanalyse uit dit document wordt hierbij gebruik gemaakt van VLOPS25³². De emissies zijn deze die beschreven werden in de vorige sectie. Voor het meteorjaar wordt gebruik gemaakt van meteorologische data voor 2017, en ook de kalibratie vindt plaats op basis van de kalibratiefactoren gekoppeld aan dit meteorjaar.

³⁰ Zie <https://www.rivm.nl/gcn-gdn-kaarten>.

³¹ www.pbl.nl

³² In vergelijking met de vorige versie van dit rapport (“Emissie en depositie van stikstof in Vlaanderen tijdens de periode 2015-2022”), [https://www.friscris.be/nl/publications/emissie-en-depositie-van-stikstof-in-vlaanderen-tijdens-de-periode-20152022\(971cb96a-bb74-40f9-9ba1-42c71d6133a4\).html](https://www.friscris.be/nl/publications/emissie-en-depositie-van-stikstof-in-vlaanderen-tijdens-de-periode-20152022(971cb96a-bb74-40f9-9ba1-42c71d6133a4).html)) werden er aanpassingen gedaan aan de parameters voor een aantal sectoren. Deze worden nu meegegeven in lijn met de parameters voor de historische tijdsreeks.

B.1 TEMPORELE ANALYSE VAN EMISSIES EN DEPOSITIES

Lineaire trend

$$I = (\bar{Y} - slope * \bar{X});$$
$$std_{I\text{ at } \bar{X}} = \sqrt{\frac{\sum [Y_i - (\text{slope} * X_i + \text{intercept})]^2}{(N - 2)N}};$$

³³ In de vorige versie van het rapport werd gebruik gemaakt van een one-tailed test. Hierdoor werd enkel gekeken of de trend significant dalend is. Aangezien de analyse echter ook trends bekijkt die significant stijgend zijn, is er geopteerd om over te schakelen om de two-tailed test.

vrijheidsgraad N-2. Concreet schatten we het betrouwbaarheidsinterval van de trend van de lineaire regressie dus in als

$$[RC - 2 * t * std_{RC} ; RC + 2 * t * std_{RC}],$$

waarbij t de hierboven beschreven teststatistiek is.

Tenslotte bepalen we de standaarddeviatie op de waarde die de trendlijn in een bepaald jaar (X) aanneemt als volgt:

$$std_{waarde\ trend\ in\ X} = \sqrt{(std_{intercept\ at\ \bar{X}})^2 + ((X - \bar{X}) * std_{trend})^2};$$

De onzekerheid op de waarde van de trendlijn in X wordt finaal ingeschat als twee maal deze standaarddeviatie, en we gebruiken dus volgend betrouwbaarheidsinterval voor de waarde van de trendlijn in X:

$$[(RC * X + I) - 2 * std_{waarde\ trend\ in\ X} ; (RC * X + I) + 2 * std_{waarde\ trend\ in\ X}].$$

Exponentiële trend

Om de exponentiële trendlijn ($Y = b * e^{a*X}$) en zijn onzekerheden te bepalen, nemen we eerst het logaritme van alle datapunten, en gebruiken nadien de bovenstaande formules voor het koppel $[\log(X_i), \log(Y_i)]$. De lineaire trend geeft dan de factor a weer uit de regressie.

B.2 SPATIO-TEMPORELE ANALYSE VAN DE DEPOSITIE

De trend per rooster cel wordt bepaald door de formules voor de lineaire trend uit bijlage B.1 toe te passen op de depositie per rooster cel. Voor elke 1 km bij 1km rooster cel wordt er dus een lineaire regressie uitgevoerd, en voor elke rooster cel wordt een richtingscoëfficiënt bepaald. Ook de standaarddeviatie van de richtingscoëfficiënt wordt voor elke rooster cel bepaald.

De onzekerheid van de trend in elke rooster cel wordt vervolgens gekwantificeerd op basis van een p-waarde. Hiertoe wordt de verhouding tussen de trend en de standaarddeviatie van de trend als een maat voor de onzekerheid op het teken van de trend beschouwd (positief: stijging, negatief: daling). De combinatie van een grote trend (sterk stijgend of sterk dalend) en een kleine standaardafwijking op deze trend geeft immers aan dat de relatieve onzekerheid op de trend klein is. We definiëren dus volgende teststatistiek $t_{(i,j)}$ voor gridcel (i,j):

$$t_{(i,j)} = \frac{RC_{(i,j)}}{std_{RC_{(i,j)}}};$$


waarbij het subscript aanduidt dat we de desbetreffende grootte evalueren voor de specifieke rooster cel. Vervolgens bepalen we de p-waarde op basis van de cumulatieve distributiefunctie van de

studentverdeling (ook gekend als de t-verdeling), waarbij het aantal vrijheidsgraden gelijk gesteld wordt aan het aantal jaren – 2.

BIJLAGE C: TRENDS VAN DE CONCENTRATIES

De concentratietrends vormen geen centraal onderdeel van dit rapport, dat zich richt op de trends in emissies en deposities, waarbij voor de deposities gebruik wordt gemaakt van constante meteorologische gegevens. Toch kunnen deposities niet los worden gezien van concentraties, en door naar de concentraties te kijken, kunnen we aanvullende interessante inzichten verkrijgen. Vandaar dat we in deze bijlage ook de evolutie van de concentraties van ammoniak en stikstofdioxide bespreken. We kijken hierbij naar de concentraties op basis van metingen, en houden dus steeds rekening met de jaarspecifieke meteorologie³⁴.


We gebruiken in deze bijlage de cijfers uit de jaarlijkse rapportage van VMM³⁵. Figuur 59 en Figuur 60 tonen respectievelijk de evolutie voor NO₂- en NH₃-concentraties. De belangrijkste conclusie is dat de evolutie van NO₂ een significant dalende trend vertoont gedurende de laatste 10 jaar, terwijl er zich voor NH₃ geen significante daling voordoet. Dit is ook het gedrag dat we reeds observeerden in de emissies. Verder zien we ook schommelingen tussen de verschillende jaren, die wijzen op de invloed van de meteorologie op de concentratietrends.



³⁴ Er gebeurt in Vlaanderen vooralsnog geen modellering met vaste meteo voor de concentratietrends.

³⁵ De cijfers en figuren zijn overgenomen van de visualisaties op <https://www.vmm.be/lucht/stikstof>.

Figuur 59: Evolutie van de jaargemiddelde NO_2 -concentratie per typegebied (in $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Bron: <https://www.vmm.be/lucht/stikstof/concentratie-stikstofdioxide>.



Figuur 60: Evolutie van de jaargemiddelde NH_3 -concentratie op basis van de metingen (in $\mu\text{g}/\text{m}^3$). De blauwe zone bakent het gebied af waarbinnen de jaargemiddelde concentraties van de individuele meetplaatsen zich bevinden.

Bron: <https://www.vmm.be/lucht/stikstof/concentratie-ammoniak>.